DE

**Gebrauchsanweisung**

**Produktbeschreibung**
ResporSoft Silicone ist eine sterile Saugkompresse für die Behandlung von mittelstark bis stark exsudierenden, akuten und chronischen Wunden. Dank der Silikonwundkontaktschicht lässt sie sich einfach anlegen und wahren, schmerzarm, atraumatisch entfernen. Die Saugkompresse nimmt Exsudat auf und bindet es.

**Zusammensetzung**
ResporSoft Silicone besteht aus einer Saugkompresse aus Zellulose und superabsorbierendem Polyacrylat, die Exsudat aufnehmen und binden kann. Die der Wunde zugewandte Seite ist mit einer Silikonschicht bedeckt, die ein einfaches Anlegen der Saugkompresse ermöglicht und das Anhaften an der Wunde verhindert. Der Verbandstoff besteht aus einem grünen Polypropylen-Vlies, das hydrophob, aber gleichzeitig luftdurchlässig ist und den Gasaustausch ermöglicht.

**Eigenschaften und Wirkungsweise**
ResporSoft Silicone nimmt Exsudat auf und bindet es in der Saugkompresse. Die silikonhaltige Silikonwundkontaktschicht verhindert ein Verstopfen der Saugkompresse und erleichtert das Anlegen. Der Verbandwechsel erfolgt atraumatisch und nahezu schmerzfrei.

**Zweckbestimmung**
ResporSoft Silicone ist eine sterile, superabsorbierende Saugkompresse für den Einmalgebrauch mit einer Silikonwundkontaktschicht zur Langzeitbehandlung verletzter Haut bei akuten und chronischen Wunden mit einer mittleren bis starken Exsudation. Das Produkt wird durch medizinische Fachkräfte ausschließlich bei Erwachsenen im klinischen Umfeld und in häuslicher Pflege angewendet und kann mit lokaler Antiseptika, primären und sekundären Wundauflagen oder Kompressionsbinden kombiniert werden.

**Indikationen**
ResporSoft Silicone eignet sich für die Behandlung von mittelstark bis stark exsudierenden Wunden: akute Wunden, chirurgische Wunden, Verbrennungen, postoperative Wunden und chronische Wunden (Ulzera, Druckulzera, Tumorwunden, diabetisches Fußsyndrom).

**Anwendungshinweise**
- Die Wunde mit physiologischer Kochsalzlösung oder gemäß ärztlicher Anweisung reinigen.
- Wählen Sie die Saugkompresse entsprechend der Wundgröße aus, sodass sie die Wundränder um ca. 1 – 2 cm überlappt. Die Saugkompresse nicht zuschneiden.
- Nach dem Spülen der Wunde und vor dem Auftragen der Saugkompresse dafür sorgen, dass der Bereich um die Wunde mit Tupfern trockengetupft wird, damit die Haftung gewährleistet ist.
- Die Schutzfolien entfernen, die Saugkompresse so auf die haftenden Seite auf der Wunde positionieren, sodass die graue Seite der Wunde abgewandt ist.
- Die Saugkompresse 2 – 3 Minuten mit der Hand leicht andrücken und anderen geeigneten Produkt fixieren oder bei Bedarf nach ärztlicher Anweisung kompressionsbinden anlegen.
- Die Saugkompresse kann – je nach Zustand der Wunde und geltendem klinischem Protokoll – bis zu 5 Tage auf der Wunde verbleiben. Bei Verdacht auf Infektion notwendig, wenn dieser Hinweis angezeigt ist oder wenn Exsudat den Rand der Saugkompresse erreicht.

**Kontraindikationen**
Verwenden Sie ResporSoft Silicone nicht bei einer Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile.

**Besondere Vorsichtsmaßnahmen**
Die Saugkompresse kann nicht zugeschnitten werden.
- Vor der Behandlung eines infizierten Wunden muss von einem Arzt eine klinische Diagnose erstellt werden. Die Behandlung mit ResporSoft Silicone kann eine Fortsetzungsbehandlung der Wundinfektion sein, wenn der Arzt dies für angezeigt hält.
- Anzeichen für eine Infektion gilt, muss diese Infektion mit einer geeigneten systemischen Behandlung behandelt werden, bevor ResporSoft Silicone verwendet werden kann.
- Bei Verwendung von Kompressionsbinden:
- Es sind keine Daten verfügbar, die die Anwendung dieser Saugkompresse bei bestimmten Patientengruppen wie Säuglingen, Kindern, Schwangeren oder stillenden Frauen unterstützen, und es liegen ebenfalls keine Daten vor, die dem widersprechen. Die Anwendung sollte bei diesen Patientengruppenstationen daher nur mit Vorsicht und aufgrund der Empfehlung eines Arztes verwendet werden.
- Es ist nicht empfehlenswert, die Applikation während des Stillens zu unterbrechen, z. B. bei Medikamenten oder Fällen.
- Die Saugkompressen, die in Peelpackungen aus Papier/Papier verpackt sind: Die Siegelnähte der Peelpackung enthalt Naturkautschuklatex, das allergische Reaktionen auslösen kann.

Die Wiederverwendung eines für den Einmalbedarf vorgesehenen Medizinprodukts ist gefährlich. Die Wiederaufbereitung von Produkten, um sie erneut zu verwenden, kann ihre Integrität und Leistung deutlich beeinträchtigen. Werden Infektionen verursacht.

**Nebenwirkungen**
Erhöhte Exsudatmenge, Mazeration, verstärkter Schmerz, Anhaften der Saugkompresse an der Wunde, Juckreiz, Brennen, Ödeme, mehrfache Unterblutungen, rötige Haut, Blasen, Erythem. Wenn eine dieser Nebenwirkungen auftritt, ziehen Sie einen Arzt hinzu.

**Meldung von Vorkommnissen**
Wenn bei Patienten/Anwendern/Dritten in der Europäischen Union und Ländern mit ähnlichen Vorschriften (Verordnung (EU) 2017/745) ein schwerwiegender Vorfall in Verbindung mit der Verwendung oder infolge der Verwendung dieses Produkts ein schwerwiegendes Vorkommnis aufgetreten ist, muss dies dem Hersteller bzw. seinem Bevollmächtigten und der nationalen zuständigen Behörde gemeldet werden.

**Produktentsorgung**
Um das Risiko potenzieller Infektionsgefahren oder einer Umweltverschmutzung zu minimieren, sollten Wegwerfkompressen des Medizinprodukts gemäß den geltenden lokalen Vorschriften für medizinische Abfälle entsorgt werden. Die Richtlinien zur Infektionsprävention entsorgt werden. Das Medizinprodukt mit dem Hausmüll entsorgen.

**Lagerung**
Trand der Temperatur zwischen 10 °C und 30 °C.

AT — PAUL HARTMANN Ges.m.b.H. · 2355 Wiener Neudorf
CH — IVF HARTMANN AG · 8212 Neuhausen

EN

**Instructions for use**

**Product description**
ResporSoft Silicone is a sterile dressing for the treatment of moderately to highly exuding, acute and chronic wounds. Thanks to the silicone wound contact layer, it is easy to apply, atraumatic and painless to remove.

**Composition**
ResporSoft Silicone comprises an absorbent pad made from cellulose and superabsorbent polyacrylate for the absorption and binding of exudate. The wound side is covered with a silicone layer to facilitate application of the dressing and promote non-adherence to the wound. The backing material is made of green-coloured, polypropylene nonwoven, which is hydrophobic but permeable to air and allows for gas exchange.

**Properties and mode of action**
ResporSoft Silicone absorbs exudate and retains it in the absorbent pad. The micro-adherent, silicone wound contact layer prevents the dressing from slipping and facilitates its application. The dressing changes are carried out atraumatically and almost painlessly.

**Intended purpose**
ResporSoft Silicone is a single use sterile superabsorbent dressing with a silicone interface for long-term treatment of injured skin, acute and chronic wounds, with moderate to high levels of exudation. It is used on adults only, by healthcare professionals in clinical or homecare environments and can be combined with local antiseptics, primary and secondary dressings and under compression.

**Indications**
ResporSoft Silicone is suitable for the treatment of wounds with moderate to high levels of exudate: acute wounds (traumatic wounds, burns, post-operative wounds) and chronic wounds (ulcers, pressure sores, tumor wounds, diabetic feet).

**Mode of application**
- Clean the wound using a physiological solution or as instructed by a clinician.
- Select a suitable dressing size for the wound making sure that the dressing overlaps the margins of the wound by approx. 1 – 2 cm. Do not cut the dressing.
- Before applying the dressing, after rinsing the wound, make sure that the area around the wound is dry using swabs to ensure that the dressing adheres.
- Remove the protective films. Place the dressing with the adherent side onto the wound, so that the green side faces away from the wound.
- Secure the dressing using a 2-Peha-fix® bandage or any other suitable fixation, or, if needed for, with compression bandages as instructed by a clinician.
- A dressing can remain in place for up to 5 days, depending on the condition of the wound and the established clinical protocol. The dressing must be changed if clinically indicated, for example, if there is a risk of infection.

**Contraindications**
Do not use ResporSoft Silicone in case of hypersensitivity to any of its components.

**Special precautions**
The wound dressing may not be cut to size.
- Before treating a wound infection or suspected infection, a clinician has to be consulted to establish a clinical diagnosis. Treatment with ResporSoft Silicone cannot replace a causal treatment of infection. If a clinician considers that there is a wound infection, the infection needs to be controlled with appropriate treatment before this dressing can be used.
- In all cases, follow the established clinical protocol.
- In the absence of available data regarding the use of this dressing on sensitive population groups such as infants, children, pregnant or nursing women, and in the absence of data to the contrary, on these population groups this dressing should be used with caution and following a clinician's recommendation.
- It is not recommended to interrupt the dressing, e.g. in the case of wounds on the feet.
- For dressings which are packed in paper-paper-peel packs: The sealed seam of the peel-pack contains natural rubber latex, which may cause allergic reactions!

Reusing a single-use medical device creates risks. Reprocessing devices in order to reuse them, may seriously damage their integrity and their performance. Infections and/or illness may result.

**Side effects**
Increased exudate, maceration, increased pain, adherence of the dressing to the wound, itching, burning, oedema, multiple subcutaneous skin bruises, blisters, erythema. If any of these side effects occur, consult a clinician.

**Incident reporting**
For a patient/user/third party in the European Union and in countries with identical/ regulatory regime (Regulation (EU) 2017/745) where any serious incident has occurred in connection with or due to this device or as a result of its use, a serious incident has occurred, please report it to the manufacturer and/or its authorized representative and to your national authority.

**Product disposal**
In order to minimize the risk of potential infection hazards, or environmental pollution, single-use dressings of the medical device should follow disposal procedures according to applicable and local laws, rules, regulations and infection prevention standards. Dispose of the medical device with household waste.

Date of revision of the text: 2020-03-31

AU — PAUL HARTMANN Pty. Ltd. · Macquarie Park, NSW 2113
NZ — PAUL HARTMANN (NZ) Limited · Mairangi Bay · Manchester CL10 2T
ZA — HARTMANN South Africa · Northriding, 2169

FR

**Instructions d'utilisation**

**Description du produit**
ResporSoft Silicone est un pansement stérile destiné au soin des plaies modérément à abondamment exsudatives, aiguës et chroniques. La couche silicone au contact de la plaie permet une application facile, atraumatique et presque indolore à la dépose.

**Composition**
ResporSoft Silicone est un pansement composé d'un coussin absorbant à base de cellulose et de polyacrylate superabsorbant, permettant l'absorption et la rétention des exsudats. Il est recouvert côté plaie d'une couche silicone pour faciliter l'application du pansement et favoriser la non-adhérence à la plaie. Le côté du pansement opposé à la plaie est recouvert d'un non-tissé en polypropylène de couleur verte, hydrophobe mais perméable à l'air et permettant les échanges gazeux.

**Propriétés et mode d'action**
ResporSoft Silicone absorbe les exsudats et les retient dans le coussin absorbant. L'interface silicone, micro-adhérente, évite au pansement de glisser et facilite son application. Les renouvellements de pansement s'effectuent de manière atraumatique et presque indolore.

**Utilisation prévue**
ResporSoft Silicone est un pansement superabsorbant stérile à usage unique avec une interface silicone pour le traitement à long terme des plaies cutanées aiguës et chroniques, avec des niveaux modérés à élevés d'exsudats. Il est utilisé uniquement chez l'adulte par des professionnels de santé en milieu clinique ou à domicile et peut être associé avec des antiseptiques locaux, des pansements primaires et secondaires ou en compression.

**Indications**
ResporSoft Silicone est indiqué pour le traitement des plaies présentant des exsudats modérés à abondants : plaies aiguës (plaies traumatiques, brûlures, plaies postopératoires) et plaies chroniques (ulcères, escarres, plaies tumorales, pieds diabétiques).

**Mode d'application**
- Nettoyer la plaie à l'aide d'une solution physiologique ou selon la prescription médicale.
- Choisir la taille du pansement adaptée à la plaie en veillant à ce que ce dernier dépasse d'environ 1 à 2 cm les marges de la plaie. Ne pas découper le pansement.
- Avant de poser le pansement, après rinçage de la plaie, veiller à bien sécher le pourtour de la plaie à l'aide de compresses afin de pouvoir garantir l'adhérence du pansement.
- Retirer les feuillets protecteurs. Poser le pansement face adhérente côté plaie, de manière à ce que la face verte soit opposée à la plaie.
- Fixation : la fixation du pansement peut se faire par un bandage Peha-haft ou tout autre système de fixation adapté, ou le cas échéant avec des bandes de compression selon la prescription médicale.
- Le pansement peut rester jusqu'à 5 jours en place sur la plaie en fonction de l'état de la plaie et du protocole clinique instauré. Le renouvellement du pansement doit s'effectuer si des signes cliniques l'imposent ou lorsque les exsudats apparaissent au niveau des bords du pansement.

**Contre-indications**
Ne pas utiliser ResporSoft Silicone en cas d'hypersensibilité à l'un des composants.

**Précautions particulières**
Le pansement ne doit pas être découpé.
- Avant tout traitement d'une plaie présentant des problèmes de cicatrisation, il est nécessaire de consulter un médecin afin qu'il établisse un diagnostic clinique. Le traitement avec ResporSoft Silicone ne remplace pas un traitement étiologique d'une infection retard de cicatrisation. En présence de signes cliniques d'infection, l'utilisation de ce pansement nécessite la mise en place préalable de l'infection par un traitement approprié.
- Dans tous les cas, suivre le protocole clinique instauré.

NL

**Gebruiksaanwijzing**

**Productbeschrijving**
ResporSoft Silicone is een steriel kompres bedoeld voor de behandeling van matig tot sterk exsuderende, acute en chronische wonden. De siliconelaag die in aanraking komt met de wond, zorgt voor een gemakkelijke aanbrenging, atraumatische en pijnarme verwijdering. Het kompres zuigt exsudaat op en bindt het.

**Samenstelling**
ResporSoft Silicone bestaat uit een absorberend wondkussen gemaakt van cellulose en superabsorberend polyacrylaat voor de absorptie en retentie van exsudaat. De wondzijde is bedekt met een siliconenlaag die het gemakkelijk aanbrengen van de verband vergemakkelijken en ervoor te zorgen dat het zich niet aan de wond hecht. De bovenkant van de verbandlaag is gemaakt van groen, niet-geweven polypropyleen dat hydrofoob is, maar waterafstotend maar luchtdoorlatend is, waardoor gaswisseling mogelijk is.

**Eigenschappen en werking**
ResporSoft Silicone absorbeert exsudaat en houdt het vast in het absorberende wondkussen. De micro-klevende, siliconenlaag voorkomt dat het kompres verschuift en zorgt ervoor dat het gemakkelijk aangebracht kan worden. De kompressenverbanden worden bijna atraumatisch en pijnloos uitgevoerd.

**Beoogd gebruik**
ResporSoft Silicone is een steriel superabsorberend kompres met een siliconenlaag voor eenmalig gebruik voor de langdurige behandeling van beschadigde huid bij acute en chronische wonden. Het wordt uitsluitend gebruikt bij volwassenen door medische professionals in een klinische omgeving of in de thuiszorg en kan worden gecombineerd met lokale antiseptica, primaire en secundaire wondverbanden en compressie.

**Indicaties**
ResporSoft Silicone is geschikt voor de behandeling van matig tot sterk exsuderende wonden: acute wonden (traumatische wonden, brandwonden, postoperatieve wonden) en chronische wonden (ulcera, doorlopwonden, tumorwonden, diabetische voeten).

**Wijze van aanbrengen**
- Maak de wond schoon met behulp van een fysiologische oplossing of volgens de voorschriften van de arts.
- Kies een geschikte kompresmaat voor de wond; zorg er daarbij voor dat het kompres de wondranden ca. 1 – 2 cm ruim overlapt. Het kompres niet op maat knippen.
- Na het spoelen van de wond moet eerst het gebied rond de wond met wattenstaafjes worden afgedroogd voordat het kompres kan worden aangebracht, anders hecht het kompres kan worden.
- Verwijder de beschermfilm. Plaats het kompres met de klevende zijde op de wond, met de groene zijde van de wond af.
- Fixeer het kompres met bijv. een Peha-haft verbandfixatie of een andere geschikt fixatiemiddel, of, indien nodig, met compressieverbanden volgens voorschrift van de arts.
- Een kompres kan maximaal 5 dagen op de wond blijven, afhankelijk van de conditie van de wond en de toegepaste klinische wond-toepassing is. Het kompres moet vervolgens worden indien klinisch geïndiceerd of wanneer het exsudaat de rand van het kompres bereikt.

**Contra-indicaties**
Gebruik ResporSoft Silicone niet in geval van overgevoeligheid voor één of meerdere bestanddelen.

**Speciale voorzorgsmaatregelen**
Het kompres mag niet op maat geknipt worden.
- Raadpleeg een arts voordat een geïnfecteerde wonden voordat u een chronische wond gaat behandelen. Een behandeling met ResporSoft Silicone is geen vervanging voor causale therapie van een infectie. Als de arts van mening is dat een wond een infectie zijn, moet de infectie worden behoerd met een adequate behandeling voordat dit wondverband kan worden gebruikt.
- Volg in alle gevallen de gestandaardiseerde klinische protocollen op.
- Bij gebrek aan beschikbare gegevens over het gebruik van kompressen bij kwetsbare bevolkingsgroepen zoals zuigelingen, kinderen en vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven, zonder dat er bij gebrek aan gegevens die het tegendeel hiervan bewijzen, dient dit kompres bij deze bevolkingsgroepen voorzichtig gebruikt te worden en op advies van de arts.
- Het wordt niet aanbevolen op het kompres te onderbreken, bijv. bij wonden aan de voeten.
- Voor kompressen die zijn verpakt in papieren peelpacks: de sealnaad van de peelpack bevat natuurlijke rubberlatex en kan allergische reacties veroorzaken!

Hergebruik van een medisch hulpmiddel voor eenmalig gebruik, dat bedoeld is om het kompressen van hulpmiddelen voor hergebruik kan de integriteit en de prestatie van de producten aanzienlijk schaden. Informatie op aanvraag beschikbaar.

**Bijwerkingen**
Toenemend exsudaat, maceratie, verhoogde pijn, wondverkleving, jeuk, brandend gevoel, oedeem, meerdere zwarten, huidblaasjes, huidverkleuring, blaren, erytheem. Raadpleeg een arts als een van deze bijwerkingen optreedt.

**Incidenten melden**
Voor patiënten/gebruikers/derde partijen in de Europese Unie en in landen met dezelfde/ regelgeving (Verordening (EU) 2017/745) inzake medische hulpmiddelen) gelde: ernstige incidenten die zich in verband met het gebruik van het hulpmiddel of als een resultaat van het gebruik ervan hebben plaatsgevonden, moeten aan de fabrikant en/of de bevoegde lidstaat en/of de bevoegde vertegenwoordiger en van nationale autoriteit.

**Afvoeren van het product**
Om het risico op infectiegevaar of milieuvervuiling te minimaliseren, moeten voor de wegwerpverbanden van het medisch hulpmiddel de procedures voor afvoer worden gevolgd overeenkomstig de geldende en lokale wetgeving, regels en normen voor infectiepreventie. Voer het medisch hulpmiddel af met het huishoudelijk afval.

Datum van herziening van de tekst: 2020-03-11

IT

**Istruzioni per l'uso**

**Descrizione del prodotto**
ResporSoft Silicone è una compressa sterile per il trattamento delle ferite superficiali da moderatamente a fortemente essudative, acute e croniche. Lo strato di silicone a contatto con la ferita ne consente la facile applicazione, riduce la rimozione quasi indolore e atraumatica. La compressa assorbente catturà l'essudato e lo trattiene con efficacia.

**Composizione**
La compressa ResporSoft Silicone è una compressa assorbente combinata composta di cellulosa e di poliacrilato superassorbente, per l'assorbimento e la ritenzione dell'essudato. Sul lato della ferita è coperta con uno strato in silicone al fine di facilitare l'applicazione sulla ferita e limitare l'adesione alla ferita. Il rivestimento della non adesione alla ferita. Il rivestimento della compressa è in tessuto non tessuto in polipropilene di colore verde, idrofobo ma permeabile all'aria, consente gli scambi gassosi.

**Proprietà e modo di azione**
ResporSoft Silicone assorbe l'essudato e lo trattiene nella compressa assorbente. L'interfaccia in silicone, micro-adesiva, impedisce lo scivolamento della compressa e ne facilita l'applicazione. La sostituzione della compressa è atraumatica e quasi indolore.

**Destinazione d'uso**
ResporSoft Silicone è una compressa superassorbente sterile monouso con un'interfaccia in silicone per il trattamento a lungo termine di ferite cutanee acute e croniche con livelli di essudato da moderato a elevato. È utilizzata solo sugli adulti da operatori sanitari in ambienti clinici o domestici e può essere combinata con antisettici locali, compresse primarie e secondarie e sotto compressione.

**Indicazioni**
ResporSoft Silicone è indicato per il trattamento di ferite con livelli di essudato da moderati ad altri: ferite acute (ferite traumatiche, ustioni, ferite post-operatorie) e ferite croniche (ulcere da decubito, ulcere tumorali, piede diabetico).

**Modalità di applicazione**
- Pulire la ferita utilizzando una soluzione fisiologica o seguendo le indicazioni fornite da un medico.
- Scegliere una compressa di dimensione adeguata in modo che ricopra la ferita estendendosi leggermente oltre i suoi margini di ca. 1-2 cm. Non tagliare la compressa.
- Prima di applicare la compressa dopo aver risciacquato la ferita, fare in modo che l'area circostante sia asciutta utilizzando dei tamponi per garantirne l'adesione.
- Staccare le pellicole protettive, mettere la compressa sulla ferita con il lato adesivo sulla ferita, in modo che il lato di colore verde sia rivolto sul lato opposto.
- Fissare la compressa con un cerotto Peha-haft o con qualsiasi altro mezzo di fissaggio idoneo, oppure, se necessario, applicare bende compressive seguendo le indicazioni fornite da un medico.
- La compressa può rimanere applicata sulla ferita per massimo 5 giorni, a seconda dello condizione della ferita e del protocollo clinico stabilito. La compressa deve essere sostituita in base alle indicazioni fornite da un medico o quando l'essudato raggiunge il bordo della compressa.

**Controindicazioni**
Non utilizzare ResporSoft Silicone in caso di ipersensibilità a uno dei suoi componenti.

**Precauzioni generali**
La compressa non può essere ritagliata su misura.
- Prima di trattare una ferita che presenta segni di infezione, è necessario consultare un medico per definire una diagnosi clinica. Il trattamento con ResporSoft Silicone non può sostituire il trattamento causale dell'infezione per la ferita, normale e ritardo di guarigione della ferita. Se sono presenti segni clinici d'infezione, questi ultimi deve essere controllata con adeguato trattamento prima di utilizzare questa compressa.
- In tutti i casi seguire il protocollo clinico in uso.
- In assenza di dati disponibili sull'utilizzo di questa medicazione su gruppi di popolazione sensibili come neonati, bambini, donne in gravidanza o in fase di allattamento, e in assenza di dati contrari a questi gruppi di popolazione deve essere impiegata con cautela su tali soggetti, seguendo le indicazioni di un medico.
- In caso di ferite ai piedi, è sconsigliabile interrompere la compressa al fine del corpo in posizione eretta.
- Per compresse confezionate in peel-pack carta-carta: La confezione interna è sigillata con lattice naturale, il quale può produrre reazioni allergiche!

Il riutilizzo di un dispositivo medico monouso è pericoloso. Riprocessare i dispositivi al fine di un riutilizzo potrebbe danneggiare gravemente la loro integrità e le loro prestazioni. Informazioni disponibili su richiesta.

**Effetti collaterali**
Aumento dell'essudato, maceration, aumento del dolore, compressa attaccata alla ferita, prurito, bruciore, edema, ulcerazioni cutanee multiple, bolle, eritema. In caso di comparsa di uno di tali effetti collaterali, consultare un medico.

**Segnalazione di incidenti**
Per un paziente/utilizzatore/terzi nell'Unione europea e in paesi con regime normativo identico (Regolamento 2017/745/UE sui dispositivi medici), se, durante l'uso del presente dispositivo o come risultato del suo utilizzo, si è verificato un incidente grave, segnalare quest'ultimo al fabbricante e/o ai suoi rappresentanti autorizzati e alla relativa autorità nazionale.

**Smaltimento del prodotto**
Per ridurre il rischio di potenziali pericoli di infezione o di inquinamento ambientale, le compresse monouso del dispositivo medico devono essere smaltite secondo le procedure di smaltimento in conformità alle leggi locali vigenti e a norme, regolamenti e standard di prevenzione delle infezioni applicabili. Smaltire i dispositivi medicali con i rifiuti domestici.

Data di revisione del testo: 2020-03-31

IT — PAUL HARTMANN S.p.A. · 37139 Verona

ES

**Instrucciones de uso**

**Descripción del producto**
ResporSoft Silicone es un apósito estéril para el tratamiento de heridas agudas y crónicas con niveles de exudado moderados a abundantes. La capa de silicona en contacto con la herida permite una aplicación fácil, atraumática y casi indolora a la retirada atraumática. La almohadilla absorbente absorbe y retiene el exudado.

**Composición**
ResporSoft Silicone incluye una almohadilla absorbente de celulosa y poliacrilato superabsorbente para la absorción y la retención de exudado. Por el lado de la herida está recubierta con una capa de silicona que facilita la aplicación del apósito y evita la adhesión a la herida. La cara posterior del apósito está fabricada en polipropileno no tejido de color verde. El material es hidrófobo pero permeable al aire, por lo que permite el intercambio de gases.

**Características y principio de acción**
ResporSoft Silicone absorbe y retiene el exudado en la almohadilla absorbente. La superficie de silicona es microadherente y ha sido diseñada para facilitar su colocación y fijación la aplicación. El apósito se puede cambiar prácticamente sin dolor ni molestias, de forma atraumática.

**Uso previsto**
ResporSoft Silicone es un apósito estéril superabsorbente y desechable con capa de silicona para el tratamiento a largo plazo de piel con heridas graves y crónicas, con niveles de exudado de moderados a elevados. Se utiliza exclusivamente en adultos por parte de profesionales sanitarios en entornos hospitalarios y domésticos. El apósito puede utilizarse junto con antisépticos locales y apósitos primarios y secundarios y con compresión.

**Indicaciones**
ResporSoft Silicone está indicado para el tratamiento de heridas agudas o crónicas con niveles de exudado moderados a abundantes, heridas graves (heridas traumáticas, quemaduras), heridas postoperatorias y heridas crónicas (úlceras, llagas por presión, heridas tumorales, pies diabéticos).

**Modo de aplicación**
- Limpie la herida con suero fisiológico o según las indicaciones del médico.
- Elija un apósito de un tamaño que cubra la herida y los bordes en una franja de aprox. 1 – 2 cm. No recorte el apósito.
- Antes de aplicar el apósito tras el lavado de la herida, asegúrese de que la zona en torno a la herida esté seca con gasas, para garantizar la adhesión del apósito.
- Retire las láminas protectoras. Aplique el apósito por el lado adherente sobre la herida, de forma que el lado verde quede en el lado opuesto a la herida.
- Fije el apósito, por ejemplo con una venda Peha-haft o cualquier otro sistema adecuado, o bien, en caso necesario, aplique vendajes compresivos según las indicaciones del médico.
- Un apósito puede dejarse en la herida hasta cinco días, en función del estado de la herida y del protocolo establecido. Siempre debe cambiarse si así está indicado por el médico o si el exudado rebasa del apósito.

**Contraindicaciones**
No utilice ResporSoft Silicone en caso de hipersensibilidad a cualquiera de sus componentes.

**Precauciones especiales**
El apósito no puede recortarse para ajustarlo al tamaño de la herida.
- Antes de tratar una herida dirtid de cicatrizar, es necesario consultar a un médico para que diagnostique las causas. Tratar una herida infectada ResporSoft Silicone no puede sustituir una terapia causal de los trastornos que afectan el proceso de cicatrización de la herida. Si existen signos clínicos de infección, se debe controlar con el tratamiento adecuado antes de utilizar el apósito.
- Siga siempre el protocolo clínico establecido.
- Ante la falta de datos que respalden el uso de este apósito en grupos sensibles como bebés, niños, embarazadas o mujeres en periodo de lactancia, y en ausencia de información lo contrario, el apósito se debe utilizar con precaución en estos grupos y de acuerdo con la recomendación del médico.
- No se recomienda estar de pie sobre el apósito, por ejemplo, en caso de heridas en los pies.
- En el caso de apósitos con envase despegable de doble capa de papel: ¡El sellado (banda azul) de este producto contiene látex natural susceptible de provocar reacciones alérgicas!

Es peligroso reutilizar un producto sanitario de un solo uso. Reprocesar los productos para volver a utilizarlos puede dañar seriamente su integridad y su rendimiento. Información disponible previa solicitud.

**Efectos secundarios**
Aumento del exudado, maceración, aumento del dolor, adherencia del apósito a la herida, prurito, escozor, edemas, múltiples hematomas cutáneos, ampollas, eritema. Si se produce cualquiera de estos efectos secundarios, consulte a un médico.

**Notificación de incidencias**
Para pacientes/usuarios/terceros de la Unión Europea y países con idéntico marco normativo (Reglamento (UE) 2017/745, sobre los productos sanitarios): si durante el uso de este dispositivo o como resultado del mismo, se produjera un incidente grave, deberá notificarse al fabricante y/o su representante autorizado, y a la autoridad nacional correspondiente.

**Eliminación del producto**
A fin de reducir al mínimo el riesgo de posibles infecciones o de contaminación medioambiental, los componentes desechables de los productos sanitarios deben seguir los procedimientos de eliminación adecuados por las leyes, normas y reglamentos locales pertinentes, así como por las normas de prevención de infecciones. Elimine el producto sanitario junto con los residuos domésticos.

Fecha de revisión del texto: 2020-03-11

ES — Laboratorios HARTMANN S.A. · 08302 Mataró

PT

**Instruções de utilização**

**Descrição do produto**
ResporSoft Silicone é uma compressa estéril para o tratamento de feridas agudas, crónicas e exsudativas de nível moderado a abundante. A camada de silicone em contacto com a ferida permite uma aplicação fácil e uma remoção praticamente indolor e sem trauma. O disco absorvente absorve e retém o exsudado.

**Composição**
ResporSoft Silicone inclui um disco absorvente feito de celulose e poliacrilato superabsorvente, para absorver e absorção e retenção de exsudado. Do lado da ferida, é coberto por uma camada de silicone que facilita a aplicação do apósito e previne a não aderência à ferida. A entretela da compressa é feita de material não-tecido de polipropileno verde, que é hidrófobo mas permeável ao ar, permitindo assim a troca gasosa.

**Propriedades e modo de ação**
A compressa ResporSoft Silicone absorve o exsudado e retém-no no disco absorvente. A interface de silicone microaderente evita que a compressa saia do sítio e facilita a aplicação da mesma. As compressas são mudadas de modo praticamente indolor e sem trauma.

**Utilização prevista**
ResporSoft Silicone é uma compressa superabsorvente estéril e descartável, com uma interface de silicone para o tratamento a longo prazo de pele lesionada, feridas agudas e crónicas, com níveis moderados a elevados de exsudado. Destina-se exclusivamente a pessoas profissionais de saúde em ambientes clínicos ou de cuidados domiciliários. Pode ser combinada com antisséptico locais, pensos primários e secundários e com compressão.

**Indicações**
A compressa ResporSoft Silicone é adequada para o tratamento de feridas com níveis moderadosídeos de exsudado: feridas agudas (feridas traumáticas, queimaduras, feridas pós-operatórias) e feridas crónicas (úlceras, escaras de pressão, feridas tumorais, pé diabético).

**Modo de utilização**
- Limpe a ferida com a solução fisiológica ou segundo as instruções do médico.
- Escolha uma compressa com o tamanho indicado para a ferida, certificando-se de que a compressa excede os bordos da ferida em cerca de 1 a 2 cm. Não corte a compressa.
- Antes de colocar a compressa e depois de limpar a ferida, use compressas para confirmar que a área em torno da ferida está seca, garantindo assim a aderência da compressa.
- Retire as películas protetoras. Coloque a compressa com o lado aderente sobre a ferida, de forma a que o lado verde não fique virado para a ferida.
- Prenda a compressa com um penso Peha-haft ou qualquer outro método de fixação adequado ou, se necessário, aplique ligaduras de compressão conforme as indicações do médico.
- A compressa pode permanecer na ferida até 5 dias, dependendo do estado da ferida e do protocolo clínico estabelecido. A compressa deve ser mudada se o médico assim o indicar, ou se o exsudado atingir o rebordo da compressa.

**Contraindicações**
Não utilize ResporSoft Silicone em caso de hipersensibilidade a qualquer um dos seus componentes.

**Precauções especiais**
A compressa não pode ser recortada à medida.
- Antes de tratar uma ferida com dificuldade de cicatrização, é necessário consultar um médico para estabelecer um diagnóstico clínico. O tratamento com ResporSoft Silicone não substitui o tratamento das causas da dificuldade de cicatrização da ferida. Em caso de sinais clínicos de infeção, esta deverá ser controlada por meio de tratamento adequado, antes de se poder utilizar esta compressa.
- Em todo o caso, siga o protocolo clínico estabelecido.
- Visto não existirem dados disponíveis que suportem a utilização desta compressa em grupos populacionais sensíveis, como por exemplo bebés, crianças, mulheres grávidas ou a amamentar, nem dados que indiquem o contrário, a utilização desta compressa por estes grupos populacionais deverá ser efetuada com precaução e seguindo a recomendação do médico.
- Não é recomendável interromper o penso no local onde a compressa foi colocada, como no caso de feridas no pé.
- Para compressas com embalagens de papel/embalagens esterets de papel: a selagem da embalagem interior contém látex natural, podendo causar reações alérgicas!

A reutilização de dispositivos médicos destinados a uma única utilização, ou a reprocessamento de dispositivos, com vista à sua reutilização, pode danificar a sua integridade e os seus desempenho. Informações disponíveis mediante solicitação.

**Efeitos secundários**
Aumento do exsudado, maceração, aumento da dor, aderência da compressa à ferida, prurido, ardor, edema, múltiplas nódoas negras, bolhas, eritema. Se qualquer um destes efeitos secundários ocorrer, deve-se consultar um médico.

**Comunicação de incidentes**
Para um paciente/utilizador/terceiro na União Europeia e nos países com regime regulamentar idêntico (Regulamento 2017/745/UE relativo aos dispositivos médicos), e, durante o uso deste dispositivo, ou como consequência do seu uso, ocorrer um incidente grave, deve reportar o ocorrido ao fabricante e/ou ao representante autorizado e à sua autoridade nacional.

**Eliminação do produto**
Para minimizar os riscos de possíveis perigos de infeção ou poluição ambiental, os componentes descartáveis do dispositivo médico devem ser eliminados em conformidade com os procedimentos de eliminação de resíduos hospitalares e normas de prevenção de infeção aplicáveis e locais. Elimine o dispositivo médico juntamente com os resíduos domésticos.

Data da revisão do texto: 2020-03-31

PT — PAUL HARTMANN LDA · 2685-378 Prior Velho

GR

**Οδηγίες χρήσης**

**Περιγραφή προϊόντος**
Το ResporSoft Silicone είναι ένα αποστειρωμένο επίθεμα για τη θεραπεία μέτριων έως εξαιρετικά εξιδρωματικών, οξέων και χρόνιων τραυμάτων. Το στρώμα σιλικόνης που έρχεται σε επαφή με το τραύμα διευκολύνει την εφαρμογή και την αφαίρεση, σχεδόν αναίμακτη και ανώδυνη.

**Σύνθεση**
Το ResporSoft Silicone περιλαμβάνει ένα απορροφητικό στρώμα κατασκευασμένο από κυτταρίνη και υπεραπορροφητικό πολυακρυλικό, για την απορρόφηση και κατακράτηση του εξιδρώματος. Η πλευρά του επιθέματος στο τραύμα είναι καλυμμένη με στρώμα σιλικόνης, το οποίο διευκολύνει την εφαρμογή του επιθέματος και αποτρέπει την προσκόλλησή του στο τραύμα. Το κάλυμμα του επιθέματος είναι κατασκευασμένο από πράσινο μη υφασμένο πολυπροπυλένιο, το οποίο είναι υδρόφοβο, αλλά ταυτόχρονα αεροδιαπερατό, διασφαλίζοντας την ανταλλαγή αερίων.

**Ιδιότητες και τρόπος δράσης**
Το ResporSoft Silicone απορροφά το εξίδρωμα και το κατακρατεί στην απορροφητική τομή. Η μικροκολλητική, σιλικονούχα επαφή με το τραύμα του επιθέματος του εμποδίζει την ολίσθησή του και διευκολύνει την τοποθέτησή του. Οι αλλαγές του επιθέματος είναι ατραυματικές και σχεδόν ανώδυνες.

**Προβλεπόμενη χρήση**
Το ResporSoft Silicone είναι ένα αποστειρωμένο, εξαιρετικά απορροφητικό επίθεμα μίας χρήσης με μη βλαπτική σιλικόνινη επαφή για μακροχρόνια θεραπεία τραυμάτων δέρματος, σε οξέα και χρόνια τραύματα, με μέτρια έως υψηλά επίπεδα εξίδρωσης. Προορίζεται αποκλειστικά για ενήλικες ασθενείς από επαγγελματίες υγείας σε κλινικό περιβάλλον ή στο σπίτι, και μπορεί να συνδυαστεί με τοπικά αντισηπτικά, πρωτεύοντα και δευτερεύοντα επίθεμα και συμπίεση.

**Ενδ

постановлением и стандартами профилактики инфекций. Утилизируйте медицинские изделия согласно с биопасными отходами.

Последняя редакция текста: 2020-03-11

RU — PAUL HARTMANN ООО · 115114 Москва

## BG

### Инструкции за употреба

**Описание на продукта**
ResposOrb Silicone е стерилен компрес за лечение на умерено до силно секретиращи рани и кухини. Силиконовият слой, намиращ се в контакт с раната, позволява лесно отстраняване и почти безболезнено, атравматично смяна на превръзката. Абсорбиращата подложка е задържа ексудата.

**Състав**
ResposOrb Silicone съдържа абсорбираща подложка, изработена от целулоза и суперабсорбиращ полиакрилат, които абсорбират и задържа ексудата. От страната на раната е покрит със силиконов слой с цел улесняване на поставянето на компреса и подлагането на неприлепнещото му към раната. Външната страна на компреса е водоплътна от едната страна от полипропиленов нетъкан текстил, който е хидрофобен, но пропуска въздух и позволява обмен на газове.

**Свойства и начин на действие**
ResposOrb Silicone абсорбира ексудата и го задържа в абсорбиращата подложка. Микродрениращият силиконов контактен слой предотвратява изместването на компреса в условията на постоянно движение му. Смяната на компреса се извършва атравматично и почти безболезнено.

**Предназначение**
ResposOrb Silicone е стерилен суперабсорбиращ компрес за ядрокарпна хирургия със силиконов контактен слой за дълготрайно лечение на умерено силна, остра и хронични рани, отделящи ексудат с умерени до високи нива. Използва се само при въпросите за медицинските специалисти в клиниките или домашни условия и може да се комбинира с локални антисептични, пчелини и вторични превръзки и компресивни бинтове.

**Показания**
ResposOrb Silicone е подходящ за лечение на рани, отделящи ексудат с умерени до високи нива: (суб)акутни и хронични рани, декубитални, следоперативни рани) и хроничния рани (язви, язви при напаст, тромбозни рани, диабетно стъпало).

**Начин на приложение**
- Почистете раната с физиологичен разтвор или както ви е инструктирал лекарят.
- Изберете компрес с подходящ за раната размер и се уверете, че компресът припокрива раната с поне 2 cm. Не нарязвайте компреса.
- За да се гарантира, че компресът да залепне, преди да го поставите и след поставянето му, разгънете, че областта около раната е суха, като използвате тампони.
- Отстранете защитната частица. Поставете компреса с адхезивната страна върху раната, така че зелената страна да е външна по отношение на раната.
- Закрепете компреса, използвайте марля, Peha-haft или друга дрехи с подходяща фиксация, или ако е необходимо, с компресивни бинтове, както ви е инструктирал лекарят.
- Един компрес може да остане върху раната до 5 дни, в зависимост от секрецията на раната. Ако има отклонения признаци на инфекция, тя трябва да бъде отменена, а е клинично показано или когато ексудатът достигне до ръба на компреса.

**Противопоказания**
Не използвайте ResposOrb Silicone при свръхчувствителност към някои от неговите съставки.

**Специални предпазни мерки**
- Преди употреба компресът трябва да бъде надлежно ли разкрит.
- Преди почистване на рана с наличието запасване трябва да се направи почистване с вода, тъкан за лечение и почистване с антисептик.
- ResposOrb Silicone не замества основното лечение на причината, довела до образуването на раната. Ако има клинични признаци на инфекция, те трябва да бъде контролирана с подходящо лечение преди използването на този компрес.
- Във всички случаи следвайте установения клиничните протоколи.
- При липса на клинични данни относно употребата на този компрес при чувствителни групи от населението, като например бебета, деца, бременни или кърмещи жени, възрастни хора и пациенти с ограничен достъп от населението този компрес трябва да се използва с повишено внимание и по медицинска преценка.
- Не се препоръчва да се стъпва върху компреса, напр. в случай на рани по стъпалото.
- За компреси, които са опаковани в стерилни опаковки изцяло от картон: Използвайте запечатания край на опаковката съдържа остър ръб, който може да предизвика алергичен реакции!

Повторната употреба на медицинско изделие за еднократна употреба е опасна. Повторна обработка на медицинско изделие с цел предотвратяване на инфекция, са трябва да бъде изключена, а е клинично показано или когато ексудатът достигне до ръба на компреса.

**Странични ефекти**
Повишено количество ексудат, мацерация, усилване на болката, пролапсване на материала към раната, сърбеж, зачервяване, отоци, неволеви реакции, разкъсване на кожата, мехури, ерити. Конструктивен от страна, ако възникне някой от тези странични ефекти.

**Съобщаване на инцидентите**
За пациентите/потребителите страна в Европейския съюз и в страни с идентичен регулаторен режим (Регламент 2017/745/ЕО за медицинските изделия): ако по време на използването на това изделие или в резултат на неговото използване възникне сериозен инцидент, моля, докладвайте го на производителя и/или упълномощения му представител и на вашия национален орган.

**Изхвърляне на продукта**
Поради да се намали рискът от възможна опасност от инфекция или замърсяване на околната среда изполозените на медицинските изделия трябва да бъдат третирани съгласно за изхвърляне на биологично опасните вещи, правила, разпоредби и стандарти за предаването от инфекциозни. Изхвърлянето медицинското изделие в битовите отпадъци.

Дата на актуализиране на текста: 2020-03-11

BG — ТП ХАРТМАНН-РИКО · 1113 София

## HR

### Upute za upotrebu

**Opis proizvoda**
ResposOrb Silicone sterilni je zavoj namijenjen za liječenje akutnih i kroničnih rana s umjerenom do jakom ekscudacijom. Silikonski sloj u dodiru s ranom omogućuje jednostavnu skidanje i gotovo bezbolnu ukanjanje bez oštećenja tkiva. Upijajući jastučić upija i zadržava ekscudat.

**Sastav**
ResposOrb Silicone sadrži upijajući jastučić napravljen od celuloze i superupijajućeg poliakrilata radi upijanja i zadržavanja ekscudata. Na strani okrenutoj prema rani prekriven je silikonskim slojem koji olakšava stavljanje zavoja i pomaže pri ograničavanju ljepljenja za rana. Poleđina zavoja napravljena je od zelenog polipropilenskog netkanog materijala koji je hidrofoban, ali propušta zrak i omogućava izmjenu plinova.

**Svojstva i način djelovanja**
ResposOrb Silicone upija ekscudat i zadržava ga u upijajućem jastučiću. Mikroadhezivni silikonski površinski sloj sprječava smicanje zavoja i olakšava njegovo postavljanje. Promjene zavoja izvode se bez oštećenja tkiva i gotovo bezbolno.

**Namjena**
ResposOrb Silicone sterilan je superupijajući zavoj za jednokratnu upotrebu sa silikonskim površinskim slojem namijenjen za dugoročno liječenje srednje jakih te jakih akutnih i kroničnih rana s umjerenom do visokom razinom ekscudata. Upotrebljava se samo na otvorenim osobama i od strane zdravstvenih djelatnika u klinikama ili kućnim okruženjima, a može se kombinirati s lokalnim antiseptičnim, primarnim i sekundarnim zavojima te kompresivnim zavojima.

**Indikacije**
ResposOrb Silicone Border primjeren je za liječenje rana s umjerenom do visokom razinom ekscudata, bio akutnima akutne (npr. donorske, traumatske i post-operativne rane) i kroničnim rane (venskoj, dekubitus, rane od tumora, dijabetička stopala).

**Način primjene**
- Ranu očistite fiziološkom otopinom ili prema uputama liječnika.
- Odaberite veličinu zavoja koja odgovara rani pazeći da zavoj prelazi preko rubova rane najmanje 1 – 2 cm. Zavoj nemojte rezati.
- Prije stavljanja zavoja, a nakon ispiranja rane, tupferom provjerite je li područje oko rane suho kako biste bolje prianjao ljepljivi dio zavoja.
- Uklonite zaštitne listove. Ljepljivu stranu zavoja položite na ranu tako da zelena strana bude okrenuta na suprotnu stranu rane.
- Učvrstite zavoj pomoću npr. zavoja Peha-haft ili bilo koje druge primjerene fiksacije ili, po potrebi, kompresivnim zavojima u skladu s uputama liječnika.
- Zavoj može ostati na rani do 5 dana, ovisno o stanju rane i ustaljenom klinički postupku. Zavoj se mora promijeniti ako je to klinički indicirano ili kada ekscudat dopre do ruba zavoja.

**Kontraindikacije**
ResposOrb Silicone nemoje koristiti u slučaju preosjetljivosti na bilo koju od njegovih komponenti.

**Posebne mjere oprezа**
Zavoj se ne smije reatiti radi prilagođavanja veličine.
- Prije ljepljenja zavoja na ranu odstranite ekscudat ili konzistuiri lječnika radi određivanja klinične dijagnoze. Lječnike zavojem ResposOrb Silicone ne može zamijeniti lječenje uzroka ili drugo lječenje koje je potrebno u skladu s klinički utvrđenim postupcima. Ako se infekcija prije upotrebe ovog zavoja mora kontrolirati odgovarajućim ljekom.
- U svim slučajevima pridržavajte se ustaljenog kliničkog protokola.
- Nedostaci da nema dostupnih podataka o primjeni ili potkrijepljuju primjenu ovog zavoja na osjetljivim segmentima populacije kao što su novorođenčad, djeca, trudnice, dojilje, starije osobe i osobe s ograničenim pristupom – skladu s ljječničkom preporukom.
- Ne preporučuje se oslanjanje na zavoj, npr. u slučaju rana na stopalima.
- Za zavoje u pakiranjem sterilnim pakiranju: zatvoreni lav na pakiranju sadrži oštar rub koji može uzrokovati alergijske reakcije!

Opasno je ponovno upotrebljavati jednokratne medicinske proizvode. Preadom proizvoda nadi ponovne upotrebe može se odbiti otežni njihova cjelovitost i učinak. Informacije su dostupne na zahtjev.

**Nuspojave**
Prijavi ekscudat, maceraciju, pojačana bol, ljuštjenje zavoja na rana, svrbež, peckanje, edem, vlaštenski vrijedovi, pojavljivanje raidira i mjehurića na koži, ekcem, ako se ne može isključiti, ne preporučuje se.

**Prijava incidenata**
Za pacijenta / korisnika / treću stranu u Europskoj uniji i zemljama s istim regulatornim sustavom (Uredba 2017/745/EU o medicinskim proizvodima): ako tijekom upotrebe ovog proizvoda dođe do ozbiljnog incidenta, prijavite incidenta proizvođaču ili njegovom ovlaštenom predstavniku te nadležnom nacionalnom tijelu vlasti.

**Zbrinjavanje proizvoda**
Da bi se rizik povezan s opasnosti od mogućе infekcije ili zagađenjem okoliša svede na najmanju moguću mjeru, za jednokratne komponente ovog medicinskog proizvoda moraju se poštivati propisane zbrinjavanja u otpad u skladu s mjerodavnim i lokalnim zakonima, pravilima, uredbama i standardima spriječanja zaraze. Ovaj medicinski proizvod zbrinite u kućanski otpad.

Datum revizije teksta: 2020-03-11

HR — PAUL HARTMANN d.o.o. · 10020 Zagreb

## RO

### Instrucțiuni de utilizare

**Descrierea produsului**
ResposOrb Silicone este un pansament steril, pentru tratarea plăgilor moderat sau puternic exsudative, acoperite cu cremă. Stratul din silicon este în contact cu rana și poate permite aderarea ușoară și îndepărtarea atraumatică, aproape nedureroasă. Tamponul absorbant colectează și reține exsudatul.

**Compoziție**
ResposOrb Silicone include un tampon absorbant, confecționat din celuloză și poliacrilat superabsorbant, pentru colectarea și reținerea exsudatului. Pe partea cu plaga, este acoperit cu un strat de silicon, care facilitează aplicarea pansamentului și previne lipirea de plagă. Stratul exterior al pansamentului este impermeabil polipropilenă netesută, de culoare verde, acest material fiind hidrofob dar permeabil la aer, permițând astfel schimbul de gaze.

**Proprietăți și mod de acțiune**
ResposOrb Silicone absoarbe exsudatul și îl reține în tamponul absorbant. Interfața micro-aderentă, din silicon, previne deplasarea pansamentului și facilitează aplicarea acestuia. Schimbarea pansamentului este atraumatică și aproape nedureroasă.

**Indicații de utilizare**
ResposOrb Silicone este un pansament superabsorbant, steril, de unică folosință, cu o interfață din silicon, destinat tratării pe termen lung al plăgilor acute și cronice, cu nivelul moderate sau ridicate de exsudat. Se utilizează la pacienți adulți, în mediul clinic sau cadrele medicalizate, de către personal medical calificat, sau în mediul casnic, la recomandarea unui cadru medical.

**Indicații**
ResposOrb Silicone este adecvat pentru tratarea plăgilor cu niveluri moderate și ridicate de exsudat: plăgi acute (plăgi traumatice, arsuri, plăgi postoperatorii) și plăgi cronice (ulcere, escare, plăgi tumorale, picioare diabetice).

**Mod de aplicare**
- Curățați plaga cu ser fiziologic sau conform instrucțiunilor medicului curant.
- Alegeți o dimensiune a pansamentului adecvată pentru plaga, asigurându-vă că partea absorbantă centrală depășește marginile plăgii cu cca 1-2 cm. Nu tăiați pansamentul.
- Înainte de aplicarea pansamentului, după clătirea plăgii, verificați dacă zona din jurul plăgii este uscată, folosind tampoane, pentru a asigura că pansamentul se va lipi.
- Desfaceți folia protectoare. Așezați pansamentul cu partea adezivă pe plagă și cu partea verde orientată către dvs.
- Fixați pansamentul folosind, de ex., un bandaj Peha-haft sau orice material de fixare adecvat sau, dacă este necesar, bandaje compresive, conform instrucțiunilor medicului clinician.
- Pansamentul poate rămâne pe plagă cel mult 5 zile, în funcție de starea plăgii și de protocolul clinic. Pansamentul trebuie schimbat la indicația clinică sau când exsudatul devine vizibil pe marginea pansamentului.

**Contraindicații**
Nu utilizați ResposOrb Silicone în caz de hipersensibilitate la oricare dintre componentele acestuia.

**Măsuri speciale de precauție**
Acest pansament nu poate fi tăiat la dimensiuni dimensionsi.
- Înainte de tratarea unei plăgi care prezintă un rim de vindecare deficitar, trebuie consultat un medic clinician în vederea stabilirii unui diagnostic. Pansamentul cu ResposOrb Silicone nu poate înlocui tratamentul cauzei vindecării precare a plăgii. Dacă există simptome clinice de infecție, acestea trebuie controlate cu un tratament adecvat înainte de utilizarea acestui pansament.
- Indiferent de situație, trebuie să respectați protocolul clinic existent.
- Dată fiind lipsa datelor care să susțină sau care să contrandime utilizarea acestui pansament la grupuri sensibile de populație, cum ar fi sugari, copii, femeile însărcinate sau care care alăptează, pansamentul trebuie utilizat cu precauție, pe baza recomandării unui medic clinician.
- Nu este recomandată sprijinirea pe pansament, de ex. în cazul plăgilor de pe picioare.
- În cazul pansamentelor în ambalaj steril de tip hârtie-hârtie: sigilul etanș al ambalajului conține latex din caucioc natural, poate cauza reacții alergice!

Reutilizarea unui dispozitiv medical de unică folosință este periculoasă. Reprocesarea dispozitivelor. În scopul reducerii riscului de infecție sau de poluare a mediului înconjurător, eliminați produsul medical în conformitate cu reglementările, normele și standardele privind gestionarea deșeurilor infecțioase. Eliminați acest produs medical împreună cu deșeurile menajere.

Data ultimei revizuiri a textului: 2020-03-11

RO — S.C. PAUL HARTMANN S.R.L. · 020194 Bucureşti

## SI

### Navodila za uporabo

**Opis izdelka**
ResposOrb Silicone je sterilna oblога za zdravljenje kroničnih in akutnih ran z zmernim do močnim izcedkom. Silikonska plast, ki je v stiku z rano, omogoča enostavno odstranjevanje in skoraj neboleče, atraumatsko odstranjevanje obloge. Vpojna blazinica vpije in zadrži izcedek.

**Sestava**
Oblога ResposOrb Silicone vsebuje vpojno blazinico iz celuloze in super vpojnega poliakrilata, ki absorbirata in zadržujeta izcedek. Na strani, ki je obrnjena proti ran, je obložena z silikonsko plastjo, ki olajša nameščanje obloge in zagotavlja, da se oblога ne sprijema z ranami. Zunanja stran obloge je izdelana iz zelene plasti netkanega polipropilena, ki je odporna proti vodi, vendar prepustna za zrak in dopušča izmenjavo plinov.

**Lastnosti in delovanje**
ResposOrb Silicone vpije ekscudat in ga zadrži v vpojni blazinici. Mikrolepilna, silikonska višina plast preprečuje pomike obloge in olajša njeno namestitev. Menjave obloge poteka atravmatično in skoraj brez bolečin.

**Namen uporabe**
ResposOrb Silicone je sterilna super vpojna oblога za enkratno uporabo s silikonsko višino plastjo namenjena za dolgotrajno zdravljenje zmerno do močno izcedkovitih ran s zmernim do močnim izcedkom. Namenjena je samo za odrasle osebe, uporabljajo pa jo lahko usposobljeni zdravstveni delavci v bolnišnicah ali v domačem okolju, lahko se kombinira z lokalnimi antiseptiki, primarnimi in sekundarnimi oblogami ter pod kompresijskimi povoji.

**Indikacije**
Oblога ResposOrb Silicone je primerna za zdravljenje ran z zmernim do močnim izcedkom: akutnih ran (npr. donorskih ran, poškodbenih ran, pooperativnih ran) in kroničnih ran (razjede zaradi pritiska, maligne kožne rane, diabetično stopalo).

**Način uporabe**
- Rano očistite s fiziološko raztopino ali po navodilih klinična zdravnika.
- Izberite ustrezno velikost obloge za rano in se prepričajte, da oblога sega čez robove rane za približno 1–2 cm. Oblоge ne obrezujte.
- Preden namestite oblogo, po tem, ko ste očistili rano, z čistenci preverite, ali je koža okoli rane suha, da zagotovite, da se bo oblога prilepila.
- Odstranite zaščitne plasti. Lepilno stran obloge namestite na rano tako, da je zelena plast obrnjena stran od rane.
- Oblogo zavarujte npr. z povoiem Peha-haft ali katerim koli drugim ustrezno fiksacijo ali po potrebi s kompresijskimi povoji v skladu z navodili zdravnika ali zdravnika klinične zdravnice.
- Oblogo lahko na rani pustite do 5 dni, odvisno od stanja rane in uveljavljenega klinična protokola. Oblogo je treba zamenjati, če se pojavijo klinične indikacije ali če ekscudat dosežе rob obloge.

**Kontraindikacije**
Oblоge ResposOrb Silicone ne uporabljajte v primeru preobčutljivosti na katero koli sestavino obloge.

**Posebni previdenčni ukrepi**
Oblоge za rane ne smete obrezovati.
- Pred začetkom zdravljenja rane z oslabljeno sposobnostjo celjenja se morate posvetovati s klinično zdravnico, da postavi diagnozo. Zdravljenje z oblogami ResposOrb Silicone ne more nadomestiti zdravljenja vzroka za počasnejše celjenje rane. Če so prisotni klinični znaki okužbe, morate okužbo obvladati z ustreznim zdravljenjem, preden takšno oblogo to oblogo.
- V vseh primerih upoštevajte ustaljeni klinični protokol.
- Če imate podatkov glede uporabe te obloge pri občutljivih skupinah prebivalstva, kot so dojenčki, otroci in starejši ali osebe z omejenim dostopom do zdravstvenih kontraindikacij pri teh skupinah predvidevamo, morate to obloge uporabljati previdno in v skladu s priporočili klinična zdravnika.
- Na oblogi in priporočilu stopi, npr. če to rane prostore na stopalu.
- Za obloge, ki so pakirane v papirni notranjo, sterilni embalaži: zapečateni šiv notranje, sterilne embalaže vsebuje naravni lateks, ki lahko povzroči alergijske reakcije!

Ponovna uporaba pripomočka za enkratno uporabo je nevarna. Predelava pripomočkov z namenom, da bi jih ponovno uporabili, lahko resno okrni njihovo celovitost in učinkovitost. Informacije so na voljo za zahtevo.

**Stranski učinki**
Povečan ekscudat, maceracija, povečana bolečina, spremljanje obloge z rano, srbečica, peklo občutek, edem, vezikulna atonacija, rdečina kože, mehurji, ekcem. Če se pojavi katen koli od teh stranskih učinkov, se posvetuje z klinično zdravnico.

**Poročanje o zapletih**
Za bolnika/uporabnika/tretjo osebo v Evropski uniji in državah z identično regulativno ureditvijo (Uredba 2017/745/EU o medicinskih pripomočkih): če med uporabo tega pripomočka ali zaradi njegove uporabe pride do resnega zapleta, o tem obvestite proizvajalca in/ali pooblaščenega zastopnika ter pristojni državni organ.

**Odstranjevanje izdelka**
Za zmanjšanje nevarnosti nastanka okužb ali onesnaževanja okolja morate pri odstranjevanju delov medicinskega pripomočka za enkratno uporabo upoštevati predpisane zahteve o ravnanju z odpadki in lokalnimi zakoni, pravili, predpisi in standardi preprečevanja okužb. Medicinski pripomoček odstranite med gospodinjske odpadke.

Datum zadnje revizije besedila: 2020-03-11

SI — PAUL HARTMANN Adriatic d.o.o. · 1000 Ljubljana

## SE

### Bruksanvisning

**Produktbeskrivning**
ResposOrb Silicone är ett sterilt förband för behandling av akuta och kroniska sår med måttlig till stor exsudatproduktion. Silikonskiktet i kontakt med såret möjliggör enkel appliering och nästan smärtfri, atraumatisk bortagning. Den absorberande dynan absorberar och håller kvar exsudatet.

**Sammansättning**
ResposOrb Silicone innehåller en absorberande dyna av cellulosa och superabsorberande polyakrylat, för absorption och retention av exsudat. På sårsidan är det täckt med ett silikonskikt som förenklar appliering av förbandet och minimerar vidhäftning mot såret. Förbandets baksida består av grönfärgad nonwoven polypropylen. Den är hydrofob men genomsläpplig för luft och tillåter gasutbyte.

**Egenskaper och verkan**
ResposOrb Silicone absorberar och håller kvar exsudatet i den absorberande dynan. Den mikrovidhäftande kontaktytan i silikon hindrar förbandet från att glida och gör det lätt att applicera. Förbandsbytet är atraumatiskt och nästan smärtfritt.

**Avsedd användning**
ResposOrb Silicone är ett superabsorberande och sterilt engångsförband med silikonyta för behandling av akuta och kroniska sår med måttlig till stor exsudatproduktion. Det är avsett för användning av utbildad sjukvårdspersonal i klinisk miljö eller i hemmet och kan kombineras med lokalt antiseptiska samt primär- och sekundärförband och kompressbandage.

**Indikationer**
ResposOrb Silicone är lämpligt vid behandling av sår med måttlig till stor exsudatproduktion: akuta sår (t.ex. traumatiska sår, donorsår, postoperativa sår) och kroniska sår (ulcerösa sår, trycksår, tumörsår, diabetiker fotsår).

**Användningsinformation**
- Rengör såret med fysiologisk lösning eller enligt läkares anvisning.
- Välj en lämplig storlek på förbandet så att förbandet går åt 1–2 cm utanför sårkanterna. Klipp inte till förbandet.
- När såret har rengjorts och innan förbandet appliceras ska ytan runt såret göras fullständigt torr med hjälp av kompresser. Detta är särskilt viktigt.
- Ta bort skyddsfolien. Lägg förbandet med fästytan mot såret, så att den gröna sidan pekar utåt från såret.
- Fäst förbandet med exempelvis Peha-haft eller annan lämplig fixering, eller vid behov med kompressbandage enligt läkares anvisningar.
- Förbandet kan sitta kvar i upp till 5 dagar beroende på sårets skick och etablerat kliniskt protokoll. Förbandet ska bytas ut när det rekommenderas av kliniska skäl eller när exsudatet når ut till kanten på förbandet.

**Kontraindikationer**
Använd inte ResposOrb Silicone om patienten är överkänslig mot någon av beståndsdelarna.

**Särskilda försiktighetsåtgärder**
Förbandet får inte skäras till vid behov.
- Innan en sårbärsinriktning behandlas måste en läkare konsulteras så att en diagnos kan ställas. Sårbehandling med förbandet ResposOrb Silicone är ingen behandling av orsakerna som ligger bakom sårläkningsstörningen. Om det finns kliniska tecken på infektion ska infektionen tas om hand med hjälp av lämplig behandling innan detta förband kan användas.
- Följ alltid etablerad klinisk protokoll.
- I avsaknad av tillgängliga data som stöder användningen av detta förband på känsliga populationer, såsom spädbarn, barn samt gravida och ammande kvinnor, och i avsaknad av data om motstaten, ska förbandet användas med försiktighet och på läkares rekommendation på dessa populationstyper.
- Du rekommenderas att inte stå på förbandet, t.ex. vid sår på fotterna.
- Förband som är förpackade i sterila papperspåsor: sigillen på påsen innehåller latexgummi som kan orsaka allergiska reaktioner!

*Det är farligt att återanvända en engångsmedicinteknisk produkt för engångsbruk. Vid behandling av produkter för återanvändning kan integriteten och prestandan allvarligt skadas. Information kan fås på begäran.*

**Biverkningar**
Ökat exsudat, maceration, ökad smärta, vidhäftning av förbandet mot såret, klåda, brännande känsla, ödem, blåsbildning, hudrodnad, hudutslag, blåsor, nödrud. Kådfråga läkare om någon av dessa biverkningar skulle uppstå.

**Incidentrapporter**
Patienter, användare och tredje part i EU och länder med identiska regulatoriska krav (förordning 2017/745/EU för medicintekniska utrustning) ska rapportera allvarliga händelser som uppstår med ett produkten använda till tillverkaren och/eller en behörig representant samt till den ansvariga myndigheten i landet.

**Bortskaffande av produkten**
För att minska risken för möjlig infektionsöverföring eller miljöförstöring ska de kasserbara delarna av den medicintekniska produkten bortskaffas enligt med de förfaranden för bortskaffande som anges i lokala bestämmelser och standarder för infektionsförebyggande. Bortskaffa den medicintekniska produkten tillsammans med hushållsavfall.

Datum för senaste revision av texten: 2020-03-11

SE — HARTMANN-ScandiCare AB · 33421 Anderstorp

## DK

### Brugsanvisning

**Produktbeskrivelse**
ResposOrb Silicone er en steril forbinding til behandling af akutte og kroniske sår med moderat til stor mængde sårudsivning. Silikonelaget i kontakt med såret gør det nemt at anlægge forbindingen og fjerne den atraumatisk og næsten smertefrit og atraumatisk. Det absorberende lag absorberer og holder på eksudatet.

**Sammensætning**
ResposOrb Silicone består af et absorberende lag af cellulose og superabsorberende polyacrylat til absorption og fastholdelse af eksudat. På sårsiden er den dækket af et silikonelag, der gør det nemmere at anlægge forbindingen og hammer vedhæftning til såret. Forbindingens bagside er lavet af grøn, non-woven polypropylen, der er hydrofob, men luftgennemtrængelig, så luftarteren kan passere.

**Egenskaber og virkemåde**
ResposOrb Silicone absorberer eksudat og holder det i det absorberende lag. Grænsefladen i silicone med mikroadhæftning forhinder forbindingen i at glide og gør den nem at anlægge. Forbindingsskift er atraumatisk og næsten smertefrit.

**Tiltænkt anvendelse**
ResposOrb Silicone er en steril, sterka kraftig absorberende forbindning til engangsbrug med en silicongrænsefladelse til langtidsbehandling af akutte og kronske sår med moderat til høj eksudat. Produktet kan anvendes af uddannede sundhedspersonale i klinikker miljøer eller hjemmesygepleje på voksne og kan kombineres med lokalt anvendte antiseptiske midler, primære og sekundære forbindinger og under kompression.

**Indikationer**
ResposOrb Silicone egner sig til behandling af akutte sår med moderate til store mængder eksudat (traumatiske sår, forbrændinger, postoperative sår) og kronske sår (ulcus, trykskr, tumorsår, diabetiske fodsår).

**Anvendelsesmetode**
- Rens såret med en fysiologisk opløsning, eller efter lægens anvisninger.
- Forbindingen vælges i en passende størrelse, så forbindingen overlapper sårkanten med en til to centimeter. Forbindingen må ikke klippes til.

Tapahtumista ilmoittaminen
Potilas, käyttäjä tai kolmas osapuoli Euroopan unionissa ja maissa, joiden hallintotapa on samanlainen (asetus 2017/745/EU lääkinnällisistä laitteista): jos tämän laitteen käytön aikana tai sen seurauksena ilmenee vakava tapahtumahaitta, ilmoita siitä valmistajalle jaitsi sen valtuutetulle edustajalle ja toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle.

Tuotteen hävittäminen
Jotta mahdollisten infektovaaranen tai ympäristön saastumisen riskit voidaan minimoida, lääkinnällisten laitteiden hävittämisen osien osalta on noudatettava soveltuvien jätelakien lakien, säädösten ja infektioiden ehkäisystandardien mukaisia määräyksiä. Hävitä lääkinnällinen laite talousjätteenä.

Tekstin muuttamispäivämäärä: 2020-03-11

## NO

### Bruksanvisning

**Produktbeskrivelse**
ResposOrb Silicone er en steril sugekompress til behandling av akutte og kronske sår med en avlyr moderat til mye sårvæske. Silikonlaget som er i kontakt med såret, gjør at det er lett å sette sugekompressen på, og atraumatisk og nesten smertefritt å fjerne den. Sugekompressen absorberer og holder tilbake sårvæsken.

**Sammensetning**
ResposOrb Silicone inneholder en absorberende pute laget av cellulose og superabsorbert polyakrylsyrat som skal absorbere og holde tilbake sårvæske. På siden som vender mot såret er den dekket med et silikonlag, som gjør det lettere å sette sugekompressen på, og som bidrar til at den ikke setter seg fast i såret. Sugekompressens bakside er laget av grønt, vannavstøtende, men luftgjennomtrengelig polypropylen. Materialet er hydrofobt, men slipper gjennom luft, og dermed kan gass utveksles.

**Egenskaper og virkemåte**
ResposOrb Silicone suger seg til bandasjen og absorberer såret. Den fuktegede sårkanten på puten. Den mikro-hefthende kontaktflaten i silikon hindrer at sugekompressen skiir av at såret, og gjør det enkelt å sette den på. Det er atraumatisk og nesten smertefritt å bytte sugekompressen.

**Tiltenkt bruk**
ResposOrb Silicone Border er et sterilt, engangs sugekompress til behandling av akutte og kroniske sår med moderate til store mengder sårvæske. Den brukes hos voksne av helsepersonell i klinikker eller pasientens hjem, og kan kombineres med lokale antiseptika samt primær- og sekundærbandasjer, og under kompresjon.

**Indikasjoner**
ResposOrb Silicone egner seg til behandling av sår med moderate til høye nivåer av sårvæske, akutte sår (traumatiske sår, brannsår, postoperative sår) og kronske sår (venøse sår, trykksår, svulstsår, diabetiske fotsår).

**Brukerveiledning**
- Rengjør såret med fysiologisk saltløsning eller i samsvar med instruksjonene fra lege.
- Velg egnet sugekompressstørrelse for såret, og sørg for at sugekompressen overlapper såret med minst 1–2 cm. Du må ikke klippe til sugekompressen.
- Før du setter sugekompressen på, etter at såret er skylt, må du påse at området rundt såret er tørt ved hjelp av kompresser, for å sikre at sugekompressen sitter godt.
- Fjern beskyttelsesarkene. Sett sugekompressen på med klebesiden vendt mot såret, og slik at grønnsiden vender bort fra såret.
- Fest sugekompressen sikkert ved hjelp av f.eks. en Peha-haft-bandasje eller annet egnet festemiddel, eller, hvis nødvendig, bandasjer og kompresjon i samsvar med instruksene fra legen.
- En sugekompress kan holdes på såret i opptil 5 dager, avhengig av sårets tilstand og fastsatt klinisk protokoll. Sugekompressen må byttes hvis det er klinisk indisert, eller når sårvæsken når frem til kanten av sugekompressen.

**Kontraindikasjoner**
ResposOrb Silicone skal ikke brukes i tilfelle overfølsomhet overfor noen av komponentene.

**Spesielle forholdsregler**
Sugekompressen på såret skal ikke klippes for å passe til sårstørrelsen.
- Før behandling av et sår med nedsatt tilhelingsevne, må du rådføre deg med lege for å stille en klinisk diagnose. Behandlingen med ResposOrb Silicone kan ikke erstatte en kausalbehandling av problemet som hindrer tilheling av såret. Hvis det er kliniske tegn på infeksjon, må infeksjonen kontrolleres med egnet behandling før denne sugekompressen brukes.
- Du må alltid følge den fastsatte kliniske protokollen.
- Ved fravær av tilgjengelige data som støtter bruken av denne sugekompressen på følsomme populasjoner, for eksempel spedbarn, gravide eller ammende kvinner, og ved fravær av resultater fra disse populasjonene, bør sugekompressen brukes på disse populasjonene med forsiktighet og etter anvisning av lege.
- Det anbefales at en ikke står på sugekompressen, for eksempel ved sår på fotsålene.
- F. eks. ved sår på fotsålene.
- For sugekompresser som er pakket i resjeangivelser med papir mot papir: Den forseglingsstripen til folieemballasjen inneholder naturgummilateks som kan utløse allergiske reaksjoner!

Gjenbruk av medisinsk engangsutstyr er farlig. Reprosessering av utstyr for å bruke det på nytt kan skade utstyrets integritet og øyke på drastisk evs. Informasjon tilgjengelig på forespørsel.

**Bivirkninger**
Økt sårvæske, maserasjon, økte smerter, festing av sugekompressen til såret, klø, svie, ødem, dannelse av flere sår, rifter i huden, blemmer, eksem. Hvis noen av disse bivirkningene forekommer, må du rådføre deg med lege.

**Melding av hendelser**
For en pasient/bruker/tredjepart i Den europeiske union og i land med identisk lovgivning (forordning 2017/745/EU om medisinsk utstyr): Hvis det har skjedd en alvorlig hendelse under bruk av denne enheten, eller som et resultat av bruken, må du melde fra til produsenten og/eller den autoriserte representanten, og til kompetent myndighet.

**Kassering av produktet**
For å redusere risikoen for mulig smittefare eller miljøforurensing bør engangsdelene av medisinske enheter kastes sammen med husholdningsavfall i henhold til lokale lover, regler, bestemmelser og standarder for infeksjonsforebygging. Det medisinske utstyret skal kastes sammen med husholdningsavfall.

Oppdateringsdato: 2020-03-11

NO — PAUL HARTMANN AS · 0278 Oslo

## FI

### Käyttöohjeet

**Tuotteen kuvaus**
ResposOrb Silicone on kohtuullisesti tai runsaasti erittävien akuuttien ja kroonisten haavojen hoitoon tarkoitettu sterili side. Haavapuolen silikonikerros mahdollistaa helpon asettamisen ja lähes kivuttoman, atraumaattisen irrottamisen. Imukykyinen tyyny imee tukkeutuneisiin ja pitää sen sisällään.

**Koostumus**
ResposOrb Silicone -sidetessä on selluloosasta ja erittäin tehokkaasta imukykyisestä polyakrylaatista valmistettu imukykyinen tyyny, joka pidättää erittäin sisällään. Haavapuolella sitessä on silikonikerros, joka helpottaa siteen asettamista ja ehkäisee sen tarttumista haavaan. Sitteen ulkopinta on vihreästä polypropeenikuitukankaasta valmistettu kerros, joka hylkii vettä, mutta päästää läpi ilmaa ja mahdollistaa kaasujen vaihdon.

**Ominaisuudet ja toimintatapa**
ResposOrb Silicone imee itseensä erittävä ja pitää ne imutyynyn sisällä. Mikrolimautuva silikonipinta estää sitteen siirtymisen ja helpottaa sen asettamista. Side voidaan vaihtaa atraumaattisesti ja lähes kivuttomasti.

**Käyttötarkoitus**
ResposOrb Silicone on kertakäyttöinen, steriili, erittäin tehokas imukykyinen, silikonipintainen sidetyyny, jota käytetään pitkäaikaishoitoon kohtalaisen tai runsaasti haitoon akuuteissa ja kroonisissa haavoissa, joissa havaitsetella erittyy kohtuullisesti tai runsaasti. Terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön klinikka- tai kotiympäristössä ja sitä voidaan käyttää yhdessä paikallisten antiseptisten aineiden sekä ensisijaisten ja toissijaisten sideiden kanssa sekä painesiteiden alla.

**Käyttöohjeet**
ResposOrb Silicone soveltuu kohtalaisesti tai runsaasti erittävien akuuttien (traumapotilaiden haavat, palovammat, leikkaushaavat) ja kroonisten haavojen, kuten makuuhaavat, kasvainhaavat, diabetikseista aiheutuvat jalkahaavat) haavojen hoitoon.

**Sidosten asettaminen**
- Puhdista haava fysiologisella liuoksella lääkärin ohjeiden mukaan.
- Valitse haavalle sopiva sidekoko niin, että side ulottuu noin 1–2 cm haavan reunojen yli. Sidettä ei saa leikata.
- Varmista haavan huolellisen jälkeen, ennen siteen asettamista, että haavaa ympäröivä iho on kuiva. Varmista näin sidoksen tarttuminen ihoon tarvittaessa pumpulipuikolla.
- Poista suojakalvot. Aseta side limapuoli alaspäin haavan päälle niin, että vihreä puoli osoittaa ylöspäin.
- Kiinnitä side esimerkiksi Peha-haft-sidoksen tai muun soveltuvan sidoksen avulla tai käytä lääkärin niin määräessä kompressosidetä.
- Sidetä voidaan pitää haavan päällä enintään viisi päivää haavan tilan ja lääkärin vahvistaman mukaan. Side on vaihdettava, jos siihen on kliinisen indikaation tai kun erittävä kudosneste ylittää sitteen reunat.

**Vasta-aiheet**
Älä käytä ResposOrb Silicone -sidetä, jos potilas on yliherkkä jollekin sen osalle.

**Erityiset varotoimet**
Sidettä ei saa leikata.
- Ennen hoitoa paran