

# biotech

## INSERT

340mm

English	French	German	Italian	Czech																												
<p><b>BIOVISIC ORTHO SINGLE</b></p> <p>Stérile. Hyaluronate. Acid viscosupplemente solution for intra-articular injection.</p> <p><b>INSTRUCTIONS FOR USE COMPOSITION</b></p> <p><b>Each ml contains:</b></p> <table> <tr> <td>Cross linked Sodium Hyaluronate</td><td>30.00 mg</td></tr> <tr> <td>Sodium Chloride</td><td>8.5 mg</td></tr> <tr> <td>Dipotassium Phosphate Dihydrate</td><td>0.20 mg</td></tr> <tr> <td>Sodium Dihydrogen Phosphate Monohydrate</td><td>0.04 mg</td></tr> <tr> <td>Water for Injection</td><td>q.s.</td></tr> </table> <p><b>DESCRIPTION</b></p> <p><b>BIOVISIC ORTHO SINGLE</b> is a sterile, transparent, homogeneous viscosupplement gel of cross-linked hyaluronate.</p> <p><b>BIOVISIC ORTHO SINGLE</b> contains 30 mg/ml of cross linked hyaluronate acid in sufficient quantities to allow viscosupplementation.</p> <p><b>BIOVISIC ORTHO SINGLE</b> is formulated with isotonic grade hyaluronate acid of biotechnical origin.</p> <p><b>INDICATIONS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>BIOVISIC ORTHO SINGLE</b> is a hyaluronate acid viscosupplement for treating mild to moderate osteoarthritis by providing joint lubrication.</li> <li><b>BIOVISIC ORTHO SINGLE</b> is indicated to relieve pain and stiffness of the knee joint in patients with mild to moderate osteoarthritis.</li> </ul> <p><b>DOSEAGE</b></p> <p><b>BIOVISIC ORTHO SINGLE</b> is intended for single injection treatment only. It is to be administered once only in one joint. <b>BIOVISIC ORTHO SINGLE</b> can relieve pain and improve mobility for up to 6 months, provided that the patient is suffering from moderate osteoarthritis of the knee joint.</p> <p><b>CONTRAINDICATIONS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>BIOVISIC ORTHO SINGLE</b> should not be injected if the patient is known to be sensitive to hyaluronate acid. Do not inject <b>BIOVISIC ORTHO SINGLE</b> into the knee joint of patients having a skin disease or infection in the area to be injected.</li> <li>Safety and Efficacy of <b>BIOVISIC ORTHO SINGLE</b> is severely affected when joint space has not been established. It is indicated in mild to moderate osteoarthritis knee joint condition. Before <b>BIOVISIC ORTHO SINGLE</b> is effective, there must be a fluid space in the joint.</li> </ul> <p><b>WARNINGS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Do not prepare the dose with disinfectants containing quaternary ammonium salts such as benzalkonium chloride which may induce precipitation of HA.</li> <li>Do not inject <b>BIOVISIC ORTHO SINGLE</b> into the joint if the patient is suffering from an active infection.</li> <li>Do not use. The viscosupplement should be considered a biological waste. If injected it may lead to any biological systems including but not limited to inflammation, infection, injury or any adverse clinical condition.</li> </ul> <p><b>PRECAUTIONS</b></p> <p><b>General</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>The safety and efficacy of <b>BIOVISIC ORTHO SINGLE</b> for conditions other than osteoarthritis of the knee have not been established.</li> <li>The safety and efficacy of the use of <b>BIOVISIC ORTHO SINGLE</b> is essentially viscosupplement in patients with mild to moderate osteoarthritis.</li> <li><b>BIOVISIC ORTHO SINGLE</b> should be used with caution when there is evidence of synovitis or osteoarthritis of the knee.</li> <li>Since viscosupplement administration may be followed.</li> <li>The contents of the vial are usually intended for single use. <b>BIOVISIC ORTHO SINGLE</b> is intended for single use. The contents of the vial are not to be used immediately after its packaging is opened. Once opened, <b>BIOVISIC ORTHO SINGLE</b> should be used within 30 days.</li> <li>Do not use. The viscosupplement should be considered a biological waste. If injected it may lead to any biological systems including but not limited to inflammation, infection, injury or any adverse clinical condition.</li> <li>Do not use <b>BIOVISIC ORTHO SINGLE</b> if package is torn or damaged.</li> </ul> <p><b>Devisioe Patient</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Provide patients with a copy of the Patient Leaflet prior to use. Mild to moderate pain, swelling and/or stiffness of the affected knee have been reported in clinical trials. The use of <b>BIOVISIC ORTHO SINGLE</b> is not intended to be used in patients with severe osteoarthritis of the knee. The patient should consult his or her physician regarding the appropriate use of viscosupplement.</li> </ul> <p><b>Use in Specific Populations</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Age:</b> Patient should be at least 18 years.</li> <li><b>Pregnancy:</b> The safety and efficacy of <b>BIOVISIC ORTHO SINGLE</b> in pregnant women have not been established.</li> <li><b>Nursing mothers:</b> It is not known if <b>BIOVISIC ORTHO SINGLE</b> is excreted in human milk. The safety and efficacy of <b>BIOVISIC ORTHO SINGLE</b> have not been established in nursing women.</li> <li><b>Pediatrics:</b> The safety and effectiveness of <b>BIOVISIC ORTHO SINGLE</b> have not been established in children.</li> </ul> <p><b>ADVERSE EVENTS</b></p> <p>No specific adverse events reported through use of <b>BIOVISIC ORTHO SINGLE</b>. However, common adverse reactions related to invasive procedures may be noted during the usage including following:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Transient joint swelling.</li> <li>Pain.</li> <li>Redness.</li> <li>Joint effusion.</li> <li>Arthritis, etc.</li> </ul> <p>According to post-marketing &amp; clinical experience of similar products from other manufacturers, anaphylactic reactions accompanied by transitory hypotension (sudden drop in blood pressure), have been rarely reported worldwide, all of which occurred either spontaneously or after consecutive injections.</p> <p><b>HOW SUPPLIED</b></p> <p><b>BIOVISIC ORTHO SINGLE</b> is supplied in a 2ml, 1ml, single use glass syringe with a Luer-lock fitting, packed in a 3 meter pack. The contents of the syringe, suitable for intra-articular injection, will gel at 37°C. It is recommended to use a needle (18G-25G) with adequate length to inject the gel into the joint.</p> <p><b>SHELF LIFE</b></p> <p>24 Months.</p> <p><b>BIOVISIC ORTHO SINGLE</b> must be used prior to the expiry date printed on the package.</p> <p><b>STORAGE INSTRUCTIONS</b></p> <p><b>BIOVISIC ORTHO SINGLE</b> should be stored, in its original packaging between 2°C to 25°C. Transport or short term storage outside this storage limit is permitted during transportation should an stability study data. Protect from sunlight and freezing.</p> <p><b>BIOVISIC ORTHO SINGLE</b> is a medical device as described in the regulatory in the knee joint as an articular viscosupplement in accordance with the local regulatory regulations.</p>	Cross linked Sodium Hyaluronate	30.00 mg	Sodium Chloride	8.5 mg	Dipotassium Phosphate Dihydrate	0.20 mg	Sodium Dihydrogen Phosphate Monohydrate	0.04 mg	Water for Injection	q.s.	<p><b>BIOVISIC ORTHO SINGLE</b></p> <p>Sterile. Hyaluronate. Acid viscosupplemente solution for intra-articular injection.</p> <p><b>INSTRUCTIONS FOR USE COMPOSITION</b></p> <p><b>Chaque ml contient:</b></p> <table> <tr> <td>Hyaluronate de sodium croisé</td><td>30.00 mg</td></tr> <tr> <td>Chlorure de sodium</td><td>8.5 mg</td></tr> <tr> <td>Dihydrogène phosphate de potassium</td><td>0.20 mg</td></tr> <tr> <td>Phosphate monohydrate de dihydrogène de sodium</td><td>0.04 mg</td></tr> <tr> <td>Eau pour injection</td><td>q.s.</td></tr> </table> <p><b>DESCRIPTION</b></p> <p><b>BIOVISIC ORTHO SINGLE</b> est un gel viscosupplémentaire stérile, transparent et homogène viscosupplémentaire à base d'acide hyaluronique croisé.</p> <p><b>BIOVISIC ORTHO SINGLE</b> contient 30 mg/ml d'acide hyaluronique croisé dans une quantité suffisante pour permettre la viscosupplémentation.</p> <p><b>BIOVISIC ORTHO SINGLE</b> est formulé avec un acide hyaluronique de grade isotonique d'origine biotechnologique.</p> <p><b>INDICATIONS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>BIOVISIC ORTHO SINGLE</b> est un viscosupplément à base d'acide hyaluronique pour le traitement de l'arthrose légère à modérée en assurant une lubrification des articulations.</li> <li><b>BIOVISIC ORTHO SINGLE</b> est indiqué pour soulager la douleur et la raideur de l'articulation du genou chez les patients souffrant de l'arthrose légère à modérée.</li> </ul> <p><b>DOSE</b></p> <p><b>BIOVISIC ORTHO SINGLE</b> est destiné à un traitement par injection unique. Ceci doit être administré une fois par semaine. <b>BIOVISIC ORTHO SINGLE</b> peut soulager la douleur et améliorer la mobilité du genou pendant 6 mois, à condition que le patient souffre d'arthrose légère à modérée de l'articulation du genou.</p> <p><b>CONTRAINDICATIONS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ne pas injecter le produit si le patient souffre d'une infection cutanée ou d'une infection systémique.</li> <li>Ne pas injecter <b>BIOVISIC ORTHO SINGLE</b> par voie intraveineuse, car cela peut entraîner des complications.</li> <li>Ne pas utiliser. Les produits viscosupplémentaires doivent être considérés comme des déchets biologiques. Une utilisation peut provoquer des réactions biologiques, infectieuses, lésions ou tout autre effet clinique non souhaité.</li> </ul> <p><b>AVERTISSEMENTS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ne pas préparer le produit avec des désinfectants contenant des sels quaternaires d'ammonium tels que le chlorure de benzalkonium susceptible de provoquer une précipitation de l'HA.</li> <li>Ne pas injecter <b>BIOVISIC ORTHO SINGLE</b> dans une articulation si le patient souffre d'une infection cutanée ou d'une infection systémique.</li> <li>Ne pas utiliser. Les produits viscosupplémentaires doivent être considérés comme des déchets biologiques. Une utilisation peut provoquer des réactions biologiques, infectieuses, lésions ou tout autre effet clinique non souhaité.</li> </ul> <p><b>PRÉCAUTIONS</b></p> <p><b>Général</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La sécurité et l'efficacité de <b>BIOVISIC ORTHO SINGLE</b> pour des conditions autres que l'arthrose du genou n'ont pas été établies.</li> <li>La sécurité et l'efficacité de l'utilisation de <b>BIOVISIC ORTHO SINGLE</b> est essentiellement viscosupplémentaire chez les patients souffrant d'arthrose légère à modérée.</li> <li>Les injections de viscosupplémentaire doivent être suivies.</li> <li>Le contenu du flacon est destiné à une utilisation unique. <b>BIOVISIC ORTHO SINGLE</b> est destiné à une utilisation unique. Le contenu du flacon ne doit pas être utilisé immédiatement après l'ouverture du flacon.</li> <li>Ne pas utiliser. Les produits viscosupplémentaires doivent être considérés comme des déchets biologiques. Une utilisation peut provoquer des réactions biologiques, infectieuses, lésions ou tout autre effet clinique non souhaité.</li> <li>Ne pas utiliser <b>BIOVISIC ORTHO SINGLE</b> si le flacon est endommagé.</li> </ul> <p><b>Devisioe Patient</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fournir aux patients une copie de la feuille d'information avant l'utilisation. Une douleur légère à modérée, un gonflement articulaire ou une effusion de genou peuvent se développer dans les deux semaines suivant l'injection. Les patients doivent consulter leur médecin si ces symptômes persistent.</li> </ul> <p><b>Utilisation pour les populations spécifiques</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Âge:</b> Les patients doivent avoir au moins 18 ans.</li> <li><b>Grossesse:</b> La sécurité et l'efficacité de <b>BIOVISIC ORTHO SINGLE</b> pendant la grossesse n'ont pas été établies.</li> <li><b>Allaitement:</b> La sécurité et l'efficacité de <b>BIOVISIC ORTHO SINGLE</b> pendant l'allaitement n'ont pas été établies.</li> <li><b>Pédiatrie:</b> La sécurité et l'efficacité de <b>BIOVISIC ORTHO SINGLE</b> chez les enfants n'ont pas été établies.</li> </ul> <p><b>EFFETS INDÉSIRABLES</b></p> <p>Aucun effet indésirable signalé avec l'utilisation de <b>BIOVISIC ORTHO SINGLE</b>. Cependant, les effets indésirables fréquents lors de procédures invasives peuvent être observés pendant l'utilisation de viscosupplémentaires, tels que :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gonflement temporaire des articulations.</li> <li>Douleur.</li> <li>Effusion articulaire.</li> </ul> <p>Selon l'expérience acquise sur une base de données de produits similaires de viscosupplémentaires, des réactions anaphylactiques accompagnées d'hypotension (chute brutale de la pression artérielle) ont été rapportées, toutes les fois où elles ont été observées, elles ont été observées soit spontanément ou après une injection successive.</p> <p><b>PRÉSENTATION</b></p> <p><b>BIOVISIC ORTHO SINGLE</b> est formulé dans une seringue à usage unique de 2ml, 1ml, sans connecteur Luer-lock, emballée dans une plaquette individuelle. Le contenu de la seringue, adapté à l'injection intra-articulaire, se gélifie à 37°C. Il est recommandé d'utiliser une aiguille (18G-25G) d'une longueur adéquate pour injecter le gel dans l'articulation.</p> <p><b>DURÉE DE CONSERVATION</b></p> <p>24 mois.</p> <p><b>BIOVISIC ORTHO SINGLE</b> doit être utilisé avant la date de péremption indiquée sur l'emballage.</p> <p><b>INSTRUCTIONS DE CONSERVATION</b></p> <p><b>BIOVISIC ORTHO SINGLE</b> doit être conservé dans son emballage d'origine entre 2°C et 25°C. Les transports ou les stocks à court terme en dehors de cette limite de conservation sont autorisés pendant le transport ou le stockage à court terme (à condition d'être protégés de la lumière et du gel).</p> <p><b>BIOVISIC ORTHO SINGLE</b> est un dispositif médical en tant que produit injecté dans l'articulation du genou en tant que viscosupplément en conformité avec la réglementation locale applicable.</p>	Hyaluronate de sodium croisé	30.00 mg	Chlorure de sodium	8.5 mg	Dihydrogène phosphate de potassium	0.20 mg	Phosphate monohydrate de dihydrogène de sodium	0.04 mg	Eau pour injection	q.s.	<p><b>BIOVISIC ORTHO SINGLE</b></p> <p>Sterile. Hyaluronate. Acid viscosupplemente solution for intra-articular injection.</p> <p><b>INSTRUCTIONS FOR USE COMPOSITION</b></p> <p><b>Jedes ml enthält:</b></p> <table> <tr> <td>Quervernetztes Natriumhyaluronat</td><td>30.00 mg</td></tr> <tr> <td>Natriumchlorid</td><td>8.5 mg</td></tr> <tr> <td>Dihydrogenphosphat Dihydrat</td><td>0.20 mg</td></tr> <tr> <td>Natrium Dihydrogenphosphat Monohydrat</td><td>0.04 mg</td></tr> <tr> <td>Isotonisches Wasser</td><td>q.s.</td></tr> </table> <p><b>BESCHREIBUNG</b></p> <p><b>BIOVISIC ORTHO SINGLE</b> ist ein steriles, transparentes, homogenes viscosupplement-Gel aus vernetztem Hyaluronat.</p> <p><b>BIOVISIC ORTHO SINGLE</b> enthält 30 mg/ml vernetztes Hyaluronat in ausreichender Menge für eine viscosupplementäre Behandlung.</p> <p><b>BIOVISIC ORTHO SINGLE</b> ist ein injizierbares Hyaluronatpräparat biotechnologischen Ursprungs.</p> <p><b>ANWENDUNG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>BIOVISIC ORTHO SINGLE</b> ist ein Hyaluronat-Viskossupplement für die Behandlung der leichten bis mittelschweren Osteoarthritis des Kniegelenks.</li> <li><b>BIOVISIC ORTHO SINGLE</b> ist zur Linderung von Schmerzen und Bewegungseinschränkung bei Patienten mit leicht bis mittelschwerer Osteoarthritis des Kniegelenks.</li> </ul> <p><b>DOSIS</b></p> <p><b>BIOVISIC ORTHO SINGLE</b> dient zur einmaligen Injektion. Es ist zu empfehlen, das Kniegelenk einmal pro Woche zu injizieren. <b>BIOVISIC ORTHO SINGLE</b> kann Schmerzen lindern und die Mobilität des Kniegelenks bis zu 6 Monaten verbessern, wenn der Patient an einer leichten bis mittelschweren Osteoarthritis des Kniegelenks leidet.</p> <p><b>KONTRAINDIKATIONEN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>BIOVISIC ORTHO SINGLE</b> sollten nicht injiziert werden, wenn ein Infekt vorliegt, der das Kniegelenk betreffen könnte.</li> <li>Bei Patienten mit einer Infektion des Kniegelenks oder einer Infektion der Haut, die das Kniegelenk betreffen könnte, sollte die Injektion von <b>BIOVISIC ORTHO SINGLE</b> unterbleiben.</li> <li>Die Sicherheit und die Wirksamkeit der gleichzeitigen Anwendung von <b>BIOVISIC ORTHO SINGLE</b> mit anderen Arzneimitteln sind nicht untersucht. Es ist zu empfehlen, dass die gleichzeitige Anwendung von <b>BIOVISIC ORTHO SINGLE</b> mit anderen Arzneimitteln nicht erfolgt.</li> </ul> <p><b>WARNUNGEN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Die Zubereitung des Produkts sollte nicht mit Desinfektionsmitteln durchgeführt werden, die quartäre Ammoniumsalze enthalten, da diese zu einer Fällung des Hyaluronats führen können.</li> <li>Das Injizieren von <b>BIOVISIC ORTHO SINGLE</b> in eine Infektion des Kniegelenks oder in eine Infektion der Haut, die das Kniegelenk betreffen könnte, ist kontraindiziert.</li> <li>Nicht verwenden. Die viscosupplementären Produkte sollten als biologischer Abfall betrachtet werden. Bei der Weiterverwendung kann durch die biologischen Reaktionen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Entzündungen, Infektionen, Verletzungen oder einen anderen klinischen Zustand, Schaden entstehen.</li> </ul> <p><b>VORSICHTSMASSNAHMEN</b></p> <p><b>Allgemein</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Die Sicherheit und die Wirksamkeit von <b>BIOVISIC ORTHO SINGLE</b> für andere Zustände als Osteoarthritis des Kniegelenks wurden nicht untersucht.</li> <li>Die Sicherheit und die Wirksamkeit der gleichzeitigen Anwendung von <b>BIOVISIC ORTHO SINGLE</b> mit anderen Arzneimitteln sind nicht untersucht.</li> <li><b>BIOVISIC ORTHO SINGLE</b> sollte nicht verwendet werden, wenn eine Infektion des Kniegelenks vorliegt.</li> <li>Die Sicherheit und die Wirksamkeit der gleichzeitigen Anwendung von <b>BIOVISIC ORTHO SINGLE</b> mit anderen Arzneimitteln sind nicht untersucht.</li> <li>Die Sicherheit und die Wirksamkeit der gleichzeitigen Anwendung von <b>BIOVISIC ORTHO SINGLE</b> mit anderen Arzneimitteln sind nicht untersucht.</li> </ul> <p><b>Informationen für Patienten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bitte lesen Sie das Handout mit den Hinweisen vor der Injektion. Eine leichte bis mittelschwere Gelenksentzündung, ein Schwellungsgefühl oder eine Rötung des Kniegelenks können auftreten. Wenn diese Symptome länger als 2 Wochen anhalten, sollten Sie Ihren Arzt konsultieren.</li> </ul> <p><b>Informationen für die Patienten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bitte lesen Sie das Handout mit den Hinweisen vor der Injektion. Eine leichte bis mittelschwere Gelenksentzündung, ein Schwellungsgefühl oder eine Rötung des Kniegelenks können auftreten. Wenn diese Symptome länger als 2 Wochen anhalten, sollten Sie Ihren Arzt konsultieren.</li> </ul> <p><b>Informationen für die Patienten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bitte lesen Sie das Handout mit den Hinweisen vor der Injektion. Eine leichte bis mittelschwere Gelenksentzündung, ein Schwellungsgefühl oder eine Rötung des Kniegelenks können auftreten. Wenn diese Symptome länger als 2 Wochen anhalten, sollten Sie Ihren Arzt konsultieren.</li> </ul> <p><b>Informationen für die Patienten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bitte lesen Sie das Handout mit den Hinweisen vor der Injektion. Eine leichte bis mittelschwere Gelenksentzündung, ein Schwellungsgefühl oder eine Rötung des Kniegelenks können auftreten. Wenn diese Symptome länger als 2 Wochen anhalten, sollten Sie Ihren Arzt konsultieren.</li> </ul> <p><b>Informationen für die Patienten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bitte lesen Sie das Handout mit den Hinweisen vor der Injektion. Eine leichte bis mittelschwere Gelenksentzündung, ein Schwellungsgefühl oder eine Rötung des Kniegelenks können auftreten. Wenn diese Symptome länger als 2 Wochen anhalten, sollten Sie Ihren Arzt konsultieren.</li> </ul> <p><b>Informationen für die Patienten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bitte lesen Sie das Handout mit den Hinweisen vor der Injektion. Eine leichte bis mittelschwere Gelenksentzündung, ein Schwellungsgefühl oder eine Rötung des Kniegelenks können auftreten. Wenn diese Symptome länger als 2 Wochen anhalten, sollten Sie Ihren Arzt konsultieren.</li> </ul> <p><b>Informationen für die Patienten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bitte lesen Sie das Handout mit den Hinweisen vor der Injektion. Eine leichte bis mittelschwere Gelenksentzündung, ein Schwellungsgefühl oder eine Rötung des Kniegelenks können auftreten. Wenn diese Symptome länger als 2 Wochen anhalten, sollten Sie Ihren Arzt konsultieren.</li> </ul> <p><b>Informationen für die Patienten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bitte lesen Sie das Handout mit den Hinweisen vor der Injektion. Eine leichte bis mittelschwere Gelenksentzündung, ein Schwellungsgefühl oder eine Rötung des Kniegelenks können auftreten. Wenn diese Symptome länger als 2 Wochen anhalten, sollten Sie Ihren Arzt konsultieren.</li> </ul> <p><b>Informationen für die Patienten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bitte lesen Sie das Handout mit den Hinweisen vor der Injektion. Eine leichte bis mittelschwere Gelenksentzündung, ein Schwellungsgefühl oder eine Rötung des Kniegelenks können auftreten. Wenn diese Symptome länger als 2 Wochen anhalten, sollten Sie Ihren Arzt konsultieren.</li> </ul> <p><b>Informationen für die Patienten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bitte lesen Sie das Handout mit den Hinweisen vor der Injektion. Eine leichte bis mittelschwere Gelenksentzündung, ein Schwellungsgefühl oder eine Rötung des Kniegelenks können auftreten. Wenn diese Symptome länger als 2 Wochen anhalten, sollten Sie Ihren Arzt konsultieren.</li> </ul> <p><b>Informationen für die Patienten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bitte lesen Sie das Handout mit den Hinweisen vor der Injektion. Eine leichte bis mittelschwere Gelenksentzündung, ein Schwellungsgefühl oder eine Rötung des Kniegelenks können auftreten. Wenn diese Symptome länger als 2 Wochen anhalten, sollten Sie Ihren Arzt konsultieren.</li> </ul> <p><b>Informationen für die Patienten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bitte lesen Sie das Handout mit den Hinweisen vor der Injektion. Eine leichte bis mittelschwere Gelenksentzündung, ein Schwellungsgefühl oder eine Rötung des Kniegelenks können auftreten. Wenn diese Symptome länger als 2 Wochen anhalten, sollten Sie Ihren Arzt konsultieren.</li> </ul> <p><b>Informationen für die Patienten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bitte lesen Sie das Handout mit den Hinweisen vor der Injektion. Eine leichte bis mittelschwere Gelenksentzündung, ein Schwellungsgefühl oder eine Rötung des Kniegelenks können auftreten. Wenn diese Symptome länger als 2 Wochen anhalten, sollten Sie Ihren Arzt konsultieren.</li> </ul> <p><b>Informationen für die Patienten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bitte lesen Sie das Handout mit den Hinweisen vor der Injektion. Eine leichte bis mittelschwere Gelenksentzündung, ein Schwellungsgefühl oder eine Rötung des Kniegelenks können auftreten. Wenn diese Symptome länger als 2 Wochen anhalten, sollten Sie Ihren Arzt konsultieren.</li> </ul> <p><b>Informationen für die Patienten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bitte lesen Sie das Handout mit den Hinweisen vor der Injektion. Eine leichte bis mittelschwere Gelenksentzündung, ein Schwellungsgefühl oder eine Rötung des Kniegelenks können auftreten. Wenn diese Symptome länger als 2 Wochen anhalten, sollten Sie Ihren Arzt konsultieren.</li> </ul> <p><b>Informationen für die Patienten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bitte lesen Sie das Handout mit den Hinweisen vor der Injektion. Eine leichte bis mittelschwere Gelenksentzündung, ein Schwellungsgefühl oder eine Rötung des Kniegelenks können auftreten. Wenn diese Symptome länger als 2 Wochen anhalten, sollten Sie Ihren Arzt konsultieren.</li> </ul> <p><b>Informationen für die Patienten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bitte lesen Sie das Handout mit den Hinweisen vor der Injektion. Eine leichte bis mittelschwere Gelenksentzündung, ein Schwellungsgefühl oder eine Rötung des Kniegelenks können auftreten. Wenn diese Symptome länger als 2 Wochen anhalten, sollten Sie Ihren Arzt konsultieren.</li> </ul> <p><b>Informationen für die Patienten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bitte lesen Sie das Handout mit den Hinweisen vor der Injektion. Eine leichte bis mittelschwere Gelenksentzündung, ein Schwellungsgefühl oder eine Rötung des Kniegelenks können auftreten. Wenn diese Symptome länger als 2 Wochen anhalten, sollten Sie Ihren Arzt konsultieren.</li> </ul> <p><b>Informationen für die Patienten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bitte lesen Sie das Handout mit den Hinweisen vor der Injektion. Eine leichte bis mittelschwere Gelenksentzündung, ein Schwellungsgefühl oder eine Rötung des Kniegelenks können auftreten. Wenn diese Symptome länger als 2 Wochen anhalten, sollten Sie Ihren Arzt konsultieren.</li> </ul> <p><b>Informationen für die Patienten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bitte lesen Sie das Handout mit den Hinweisen vor der Injektion. Eine leichte bis mittelschwere Gelenksentzündung, ein Schwellungsgefühl oder eine Rötung des Kniegelenks können auftreten. Wenn diese Symptome länger als 2 Wochen anhalten, sollten Sie Ihren Arzt konsultieren.</li> </ul> <p><b>Informationen für die Patienten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bitte lesen Sie das Handout mit den Hinweisen vor der Injektion. Eine leichte bis mittelschwere Gelenksentzündung, ein Schwellungsgefühl oder eine Rötung des Kniegelenks können auftreten. Wenn diese Symptome länger als 2 Wochen anhalten, sollten Sie Ihren Arzt konsultieren.</li> </ul> <p><b>Informationen für die Patienten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bitte lesen Sie das Handout mit den Hinweisen vor der Injektion. Eine leichte bis mittelschwere Gelenksentzündung, ein Schwellungsgefühl oder eine Rötung des Kniegelenks können auftreten. Wenn diese Symptome länger als 2 Wochen anhalten, sollten Sie Ihren Arzt konsultieren.</li> </ul> <p><b>Informationen für die Patienten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bitte lesen Sie das Handout mit den Hinweisen vor der Injektion. Eine leichte bis mittelschwere Gelenksentzündung, ein Schwellungsgefühl oder eine Rötung des Kniegelenks können auftreten. Wenn diese Symptome länger als 2 Wochen anhalten, sollten Sie Ihren Arzt konsultieren.</li> </ul> <p><b>Informationen für die Patienten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bitte lesen Sie das Handout mit den Hinweisen vor der Injektion. Eine leichte bis mittelschwere Gelenksentzündung, ein Schwellungsgefühl oder eine Rötung des Kniegelenks können auftreten. Wenn diese Symptome länger als 2 Wochen anhalten, sollten Sie Ihren Arzt konsultieren.</li> </ul> <p><b>Informationen für die Patienten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bitte lesen Sie das Handout mit den Hinweisen vor der Injektion. Eine leichte bis mittelschwere Gelenksentzündung, ein Schwellungsgefühl oder eine Rötung des Kniegelenks können auftreten. Wenn diese Symptome länger als 2 Wochen anhalten, sollten Sie Ihren Arzt konsultieren.</li> </ul> <p><b>Informationen für die Patienten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bitte lesen Sie das Handout mit den Hinweisen vor der Injektion. Eine leichte bis mittelschwere Gelenksentzündung, ein Schwellungsgefühl oder eine Rötung des Kniegelenks können auftreten. Wenn diese Symptome länger als 2 Wochen anhalten, sollten Sie Ihren Arzt konsultieren.</li> </ul> <p><b>Informationen für die Patienten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bitte lesen Sie das Handout mit den Hinweisen vor der Injektion. Eine leichte bis mittelschwere Gelenksentzündung, ein Schwellungsgefühl oder eine Rötung des Kniegelenks können auftreten. Wenn diese Symptome länger als 2 Wochen anhalten, sollten Sie Ihren Arzt konsultieren.</li> </ul> <p><b>Informationen für die Patienten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bitte lesen Sie das Handout mit den Hinweisen vor der Injektion. Eine leichte bis mittelschwere Gelenksentzündung, ein Schwellungsgefühl oder eine Rötung des Kniegelenks können auftreten. Wenn diese Symptome länger als 2 Wochen anhalten, sollten Sie Ihren Arzt konsultieren.</li> </ul> <p><b>Informationen für die Patienten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bitte lesen Sie das Handout mit den Hinweisen vor der Injektion. Eine leichte bis mittelschwere Gelenksentzündung, ein Schwellungsgefühl oder eine Rötung des Kniegelenks können auftreten. Wenn diese Symptome länger als 2 Wochen anhalten, sollten Sie Ihren Arzt konsultieren.</li> </ul> <p><b>Informationen für die Patienten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bitte lesen Sie das Handout mit den Hinweisen vor der Injektion. Eine leichte bis mittelschwere Gelenksentzündung, ein Schwellungsgefühl oder eine Rötung des Kniegelenks können auftreten. Wenn diese Symptome länger als 2 Wochen anhalten, sollten Sie Ihren Arzt konsultieren.</li> </ul> <p><b>Informationen für die Patienten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bitte lesen Sie das Handout mit den Hinweisen vor der Injektion. Eine leichte bis mittelschwere Gelenksentzündung, ein Schwellungsgefühl oder eine Rötung des Kniegelenks können auftreten. Wenn diese Symptome länger als 2 Wochen anhalten, sollten Sie Ihren Arzt konsultieren.</li> </ul> <p><b>Informationen für die Patienten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bitte lesen Sie das Handout mit den Hinweisen vor der Injektion. Eine leichte bis mittelschwere Gelenksentzündung, ein Schwellungsgefühl oder eine Rötung des Kniegelenks können auftreten. Wenn diese Symptome länger als 2 Wochen anhalten, sollten Sie Ihren Arzt konsultieren.</li> </ul> <p><b>Informationen für die Patienten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bitte lesen Sie das Handout mit den Hinweisen vor der Injektion. Eine leichte bis mittelschwere Gelenksentzündung, ein Schwellungsgefühl oder eine Rötung des Kniegelenks können auftreten. Wenn diese Symptome länger als 2 Wochen anhalten, sollten Sie Ihren Arzt konsultieren.</li> </ul> <p><b>Informationen für die Patienten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bitte lesen Sie das Handout mit den Hinweisen vor der Injektion. Eine leichte bis mittelschwere Gelenksentzündung, ein Schwellungsgefühl oder eine Rötung des Kniegelenks können auftreten. Wenn diese Symptome länger als 2 Wochen anhalten, sollten Sie Ihren Arzt konsultieren.</li> </ul> <p><b>Informationen für die Patienten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bitte lesen Sie das Handout mit den Hinweisen vor der Injektion. Eine leichte bis mittelschwere Gelenksentzündung, ein Schwellungsgefühl oder eine Rötung des Kniegelenks können auftreten. Wenn diese Symptome länger als 2 Wochen anhalten, sollten Sie Ihren Arzt konsultieren.</li> </ul> <p><b>Informationen für die Patienten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bitte lesen Sie das Handout mit den Hinweisen vor der Injektion. Eine leichte bis mittelschwere Gelenksentzündung, ein Schwellungsgefühl oder eine Rötung des Kniegelenks können auftreten. Wenn diese Symptome länger als 2 Wochen anhalten, sollten Sie Ihren Arzt konsultieren.</li> </ul> <p><b>Informationen für die Patienten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bitte lesen Sie das Handout mit den Hinweisen vor der Injektion. Eine leichte bis mittelschwere Gelenksentzündung, ein Schwellungsgefühl oder eine Rötung des Kniegelenks können auftreten. Wenn diese Symptome länger als 2 Wochen anhalten, sollten Sie Ihren Arzt konsultieren.</li> </ul> <p><b>Informationen für die Patienten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bitte lesen Sie das Handout mit den Hinweisen vor der Injektion. Eine leichte bis mittelschwere Gelenksentzündung, ein Schwellungsgefühl oder eine Rötung des Kniegelenks können auftreten. Wenn diese Symptome länger als 2 Wochen anhalten, sollten Sie Ihren Arzt konsultieren.</li> </ul> <p><b>Informationen für die Patienten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bitte lesen Sie das Handout mit den Hinweisen vor der Injektion. Eine leichte bis mittelschwere Gelenksentzündung, ein Schwellungsgefühl oder eine Rötung des Kniegelenks können auftreten. Wenn diese Symptome länger als 2 Wochen anhalten, sollten Sie Ihren Arzt konsultieren.</li> </ul> <p><b>Informationen für die Patienten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bitte lesen Sie das Handout mit den Hinweisen vor der Injektion. Eine leichte bis mittelschwere Gelenksentzündung, ein Schwellungsgefühl oder eine Rötung des Kniegelenks können auftreten. Wenn diese Symptome länger als 2 Wochen anhalten, sollten Sie Ihren Arzt konsultieren.</li> </ul> <p><b>Informationen für die Patienten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bitte lesen Sie das Handout mit den Hinweisen vor der Injektion. Eine leichte bis mittelschwere Gelenksentzündung, ein Schwellungsgefühl oder eine Rötung des Kniegelenks können auftreten. Wenn diese Symptome länger als 2 Wochen anhalten, sollten Sie Ihren Arzt konsultieren.</li> </ul> <p><b>Informationen für die Patienten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bitte lesen Sie das Handout mit den Hinweisen vor der Injektion. Eine leichte bis mittelschwere Gelenksentzündung, ein Schwellungsgefühl oder eine Rötung des Kniegelenks können auftreten. Wenn diese Symptome länger als 2 Wochen anhalten, sollten Sie Ihren Arzt konsultieren.</li> </ul> <p><b>Informationen für die Patienten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bitte lesen Sie das Handout mit den Hinweisen vor der Injektion. Eine leichte bis mittelschwere Gelenksentzündung, ein Schwellungsgefühl oder eine Rötung des Kniegelenks können auftreten. Wenn diese Symptome länger als 2 Wochen anhalten, sollten Sie Ihren Arzt konsultieren.</li> </ul> <p><b>Informationen für die Patienten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bitte lesen Sie das Handout mit den Hinweisen vor der Injektion. Eine leichte bis mittelschwere Gelenksentzündung, ein Schwellungsgefühl oder eine Rötung des Kniegelenks können auftreten. Wenn diese Symptome länger als 2 Wochen anhalten, sollten Sie Ihren Arzt konsultieren.</li> </ul> <p><b>Informationen für die Patienten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bitte lesen Sie das Handout mit den Hinweisen vor der Injektion. Eine leichte bis mittelschwere Gelenksentzündung, ein Schwellungsgefühl oder eine Rötung des Kniegelenks können auftreten. Wenn diese Symptome länger als 2 Wochen anhalten, sollten Sie Ihren Arzt konsultieren.</li> </ul> <p><b>Informationen für die Patienten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bitte lesen Sie das Handout mit den Hinweisen vor der Injektion. Eine leichte bis mittelschwere Gelenksentzündung, ein Schwellungsgefühl oder eine Rötung des Kniegelenks können auftreten. Wenn diese Symptome länger als 2 Wochen anhalten, sollten Sie Ihren Arzt konsultieren.</li> </ul> <p><b>Informationen für die Patienten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bitte lesen Sie das Handout mit den Hinweisen vor der Injektion. Eine leichte bis mittelschwere Gelenksentzündung, ein Schwellungsgefühl oder eine Rötung des Kniegelenks können auftreten. Wenn diese Symptome länger als 2 Wochen anhalten, sollten Sie Ihren Arzt konsultieren.</li> </ul> <p><b>Informationen für die Patienten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bitte lesen Sie das Handout mit den Hinweisen vor der Injektion. Eine leichte bis mittelschwere Gelenksentzündung, ein Schwellungsgefühl oder eine Rötung des Kniegelenks können auftreten. Wenn diese Symptome länger als 2 Wochen anhalten, sollten Sie Ihren Arzt konsultieren.</li> </ul> <p><b>Informationen für die Patienten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bitte lesen Sie das Handout mit den Hinweisen vor der Injektion. Eine leichte bis mittelschwere Gelenksentzündung, ein Schwellungsgefühl oder eine Rötung des Kniegelenks können auftreten. Wenn diese Symptome länger als 2 Wochen anhalten, sollten Sie Ihren Arzt konsultieren.</li> </ul> <p><b>Informationen für die Patienten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bitte lesen Sie das Handout mit den Hinweisen vor der Injektion. Eine leichte bis mittelschwere Gelenksentzündung, ein Schwellungsgefühl oder eine Rötung des Kniegelenks können auftreten. Wenn diese Symptome länger als 2 Wochen anhalten, sollten Sie Ihren Arzt konsultieren.</li> </ul> <p><b>Informationen für die Patienten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bitte lesen Sie das Handout mit den Hinweisen vor der Injektion. Eine leichte bis mittelschwere Gelenksentzündung, ein Schwellungsgefühl oder eine Rötung des Kniegelenks können auftreten. Wenn diese Symptome länger als 2 Wochen anhalten, sollten Sie Ihren Arzt konsultieren.</li> </ul> <p><b>Informationen für die Patienten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bitte lesen Sie das Handout mit den Hinweisen vor der Injektion. Eine leichte bis mittelschwere Gelenksentzündung, ein Schwellungsgefühl oder eine Rötung des Kniegelenks können auftreten. Wenn diese Symptome länger als 2 Wochen anhalten, sollten Sie Ihren Arzt konsultieren.</li> </ul> <p><b>Informationen für die Patienten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bitte lesen Sie das Handout mit den Hinweisen vor der Injektion. Eine leichte bis mittelschwere Gelenksentzündung, ein Schwellungsgefühl oder eine Rötung des Kniegelenks können auftreten. Wenn diese Symptome länger als 2 Wochen anhalten, sollten Sie Ihren Arzt konsultieren.</li> </ul> <p><b>Informationen für die Patienten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bitte lesen Sie das Handout mit den Hinweisen vor der Injektion. Eine leichte bis mittelschwere Gelenksentzündung, ein Schwellungsgefühl oder eine Rötung des Kniegelenks können auftreten. Wenn diese Symptome länger als 2 Wochen anhalten, sollten Sie Ihren Arzt konsultieren.</li> </ul> <p><b>Informationen für die Patienten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bitte lesen Sie das Handout mit den Hinweisen vor der Injektion. Eine leichte bis mittelschwere Gelenksentzündung, ein Schwellungsgefühl oder eine Rötung des Kniegelenks können auftreten. Wenn diese Symptome länger als 2 Wochen anhalten, sollten Sie Ihren Arzt konsultieren.</li> </ul> <p><b>Informationen für die Patienten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bitte lesen Sie das Handout mit den Hinweisen vor der Injektion. Eine leichte bis mittelschwere Gelenksentzündung, ein Schwellungsgefühl oder eine Rötung des Kniegelenks können auftreten. Wenn diese Symptome länger als 2 Wochen anhalten, sollten Sie Ihren Arzt konsultieren.</li> </ul> <p><b>Informationen für die Patienten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bitte lesen Sie das Handout mit den Hinweisen vor der Injektion. Eine leichte bis mittelschwere Gelenksentzündung, ein Schwellungsgefühl oder eine Rötung des Kniegelenks können auftreten. Wenn diese Symptome länger als 2 Wochen anhalten, sollten Sie Ihren Arzt konsultieren.</li> </ul> <p><b>Informationen für die Patienten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bitte lesen Sie das Handout mit den Hinweisen vor der Injektion. Eine leichte bis mittelschwere Gelenksentzündung, ein Schwellungsgefühl oder eine Rötung des Kniegelenks können auftreten. Wenn diese Symptome länger als 2 Wochen anhalten, sollten Sie Ihren Arzt konsultieren.</li> </ul> <p><b>Informationen für die Patienten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bitte lesen Sie das Handout mit den Hinweisen vor der Injektion. Eine leichte bis mittelschwere Gelenksentzündung, ein Schwellungsgefühl oder eine Rötung des Kniegelenks können auftreten. Wenn diese Symptome länger als 2 Wochen anhalten, sollten Sie Ihren Arzt konsultieren.</li> </ul> <p><b>Informationen für die Patienten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bitte lesen Sie das Handout mit den Hinweisen vor der Injektion. Eine leichte bis mittelschwere Gelenksentzündung, ein Schwellungsgefühl oder eine Rötung des Kniegelenks können auftreten. Wenn diese Symptome länger als 2 Wochen anhalten, sollten Sie Ihren Arzt konsultieren.</li> </ul> <p><b>Informationen für die Patienten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bitte lesen Sie das Handout mit den Hinweisen vor der Injektion. Eine leichte bis mittelschwere Gelenksentzündung, ein Schwellungsgefühl oder eine Rötung des Kniegelenks können auftreten. Wenn diese Symptome länger als 2 Wochen anhalten, sollten Sie Ihren Arzt konsultieren.</li> </ul> <p><b>Informationen für die Patienten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bitte lesen Sie das Handout mit den Hinweisen vor der Injektion. Eine leichte bis mittelschwere Gelenksentzündung, ein Schwellungsgefühl oder eine Rötung des Kniegelenks können auftreten. Wenn diese Symptome länger als 2 Wochen anhalten, sollten Sie Ihren Arzt konsultieren.</li> </ul> <p><b>Informationen für die Patienten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bitte lesen Sie das Handout mit den Hinweisen vor der Injektion. Eine leichte bis mittelschwere Gelenksentzündung, ein Schwellungsgefühl oder eine Rötung des Kniegelenks können auftreten. Wenn diese Symptome länger als 2 Wochen anhalten, sollten Sie Ihren Arzt konsultieren.</li> </ul> <p><b>Informationen für die Patienten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bitte lesen Sie das Handout mit den Hinweisen vor der Injektion. Eine leichte bis mittelschwere Gelenksentzündung, ein Schwellungsgefühl oder eine Rötung des Kniegelenks können auftreten. Wenn diese Symptome länger als 2 Wochen anhalten, sollten Sie Ihren Arzt konsultieren.</li> </ul> <p><b>Informationen für die Patienten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bitte lesen Sie das Handout mit den Hinweisen vor der Injektion. Eine leichte bis mittelschwere Gelenksentzündung, ein Schwellungsgefühl oder eine Rötung des Kniegelenks können auftreten. Wenn diese Symptome länger als 2 Wochen anhalten, sollten Sie Ihren Arzt konsultieren.</li> </ul> <p><b>Informationen für die Patienten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bitte lesen Sie das Handout mit den Hinweisen vor der Injektion. Eine leichte bis mittelschwere Gelenksentzündung, ein Schwellungsgefühl oder eine Rötung des Kniegelenks können auftreten. Wenn diese Symptome länger als 2 Wochen anhalten, sollten Sie Ihren Arzt konsultieren.</li> </ul> <p><b>Informationen für die Patienten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bitte lesen Sie das Handout mit den Hinweisen vor der Injektion. Eine leichte bis mittelschwere Gelenksentzündung, ein Schwellungsgefühl oder eine Rötung des Kniegelenks können auftreten. Wenn diese Symptome länger als 2 Wochen anhalten, sollten Sie Ihren Arzt konsultieren.</li> </ul> <p><b>Informationen für die Patienten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bitte lesen Sie das Handout mit den Hinweisen vor der Injektion. Eine leichte bis mittelschwere Gelenksentzündung, ein Schwellungsgefühl oder eine Rötung des Kniegelenks können auftreten. Wenn diese Symptome länger als 2 Wochen anhalten, sollten Sie Ihren Arzt konsultieren.</li> </ul> <p><b>Informationen für die Patienten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bitte lesen Sie das Handout mit den Hinweisen vor der Injektion. Eine leichte bis mittelschwere Gelenksentzündung, ein Schwellungsgefühl oder eine Rötung des Kniegelenks können auftreten. Wenn diese Symptome länger als 2 Wochen anhalten, sollten Sie Ihren Arzt konsultieren.</li> </ul> <p><b>Informationen für die Patienten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bitte lesen Sie das Handout mit den Hinweisen vor der Injektion. Eine leichte bis mittelschwere Gelenksentzündung, ein Schwellungsgefühl oder eine Rötung des Kniegelenks können auftreten. Wenn diese Symptome länger als 2 Wochen anhalten, sollten Sie Ihren Arzt konsultieren.</li> </ul> <p><b>Informationen für die Patienten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bitte lesen Sie das Handout mit den Hinweisen vor der Injektion. Eine leichte bis mittelschwere Gelenksentzündung, ein Schwellungsgefühl oder eine Rötung des Kniegelenks können auftreten. Wenn diese Symptome länger als 2 Wochen anhalten, sollten Sie Ihren Arzt konsultieren.</li> </ul> <p><b>Informationen für die Patienten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bitte lesen Sie das Handout mit den Hinweisen vor der Injektion. Eine leichte bis mittelschwere Gelenksentzündung, ein Schwellungsgefühl oder eine Rötung des Kniegelenks können auftreten. Wenn diese Symptome länger als 2 Wochen anhalten, sollten Sie Ihren Arzt konsultieren.</li> </ul> <p><b>Informationen für die Patienten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bitte lesen Sie das Handout mit den Hinweisen vor der Injektion. Eine leichte bis mittelschwere Gelenksentzündung, ein Schwellungsgefühl oder eine Rötung des Kniegelenks können auftreten. Wenn diese Symptome länger als 2 Wochen anhalten, sollten Sie Ihren Arzt konsultieren.</li> </ul> <p><b>Informationen für die Patienten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bitte lesen Sie das Handout mit den Hinweisen vor der Injektion. Eine leichte bis mittelschwere Gelenksentzündung, ein Schwellungsgefühl oder eine Rötung des Kniegelenks können auftreten. Wenn diese Symptome länger als 2 Wochen anhalten, sollten Sie Ihren Arzt konsultieren.</li> </ul> <p><b>Informationen für die Patienten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bitte lesen Sie das Handout mit den Hinweisen vor der Injektion. Eine leichte bis mittelschwere Gelenksentzündung, ein Schwellungsgefühl oder eine Rötung des Kniegelenks können auftreten. Wenn diese Symptome länger als 2 Wochen anhalten, sollten Sie Ihren Arzt konsultieren.</li> </ul> <p><b>Informationen für die Patienten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bitte lesen Sie das Handout mit den Hinweisen vor der Injektion. Eine leichte bis mittelschwere Gelenksentzündung, ein Schwellungsgefühl oder eine Rötung des Kniegelenks können auftreten. Wenn diese Symptome länger als 2 Wochen anhalten, sollten Sie Ihren Arzt konsultieren.</li> </ul> <p><b>Informationen für die Patienten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bitte lesen Sie das Handout mit den Hinweisen vor der Injektion</li></ul>	Quervernetztes Natriumhyaluronat	30.00 mg	Natriumchlorid	8.5 mg	Dihydrogenphosphat Dihydrat	0.20 mg	Natrium Dihydrogenphosphat Monohydrat	0.04 mg	Isotonisches Wasser	q.s.
Cross linked Sodium Hyaluronate	30.00 mg																															
Sodium Chloride	8.5 mg																															
Dipotassium Phosphate Dihydrate	0.20 mg																															
Sodium Dihydrogen Phosphate Monohydrate	0.04 mg																															
Water for Injection	q.s.																															
Hyaluronate de sodium croisé	30.00 mg																															
Chlorure de sodium	8.5 mg																															
Dihydrogène phosphate de potassium	0.20 mg																															
Phosphate monohydrate de dihydrogène de sodium	0.04 mg																															
Eau pour injection	q.s.																															
Quervernetztes Natriumhyaluronat	30.00 mg																															
Natriumchlorid	8.5 mg																															
Dihydrogenphosphat Dihydrat	0.20 mg																															
Natrium Dihydrogenphosphat Monohydrat	0.04 mg																															
Isotonisches Wasser	q.s.																															



## BIOVISC ORTHO SINGLE

[illegible]