



# ČESKÁ SPOLEČNOST ALERGOLOGIE A KLINICKÉ IMUNOLOGIE

Prof. MUDr. Petr Panzner, CSc.  
Předseda ČSAKI ČLS JEP  
Přednosta Ústavu imunologie a alergologie  
LF UK a FN Plzeň  
Alej Svobody 80  
30460 Plzeň

Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o.  
Škrétova 490/12  
120 00 Praha 2

Plzeň, 23. 3. 2020

## **Podpora návrhu rozšíření úhrady jehel pro subkutánní podání léčiv i pro další lékařské specializace**

Výbor České společnosti alergologie a klinické imunologie plně podporuje návrh na rozšíření limitace úhrady jehel k subkutánnímu podání léků na další specializace, jmenovitě na onkologii a hematologii.

Subkutánní podávání imunoglobulinů je nyní upřednostňovanou alternativou intravenózní substituční imunoglobulinové léčby nemocných s hypogamaglobuliemiemi. Výhodou tohoto podání je možnost domácího podávání, což šetří nemocniční kapacity a zlepšuje komfort léčby pacienta. Subkutánní imunoglobulinová léčba je obvykle podávána jednou až dvakrát týdně, na rozdíl od léčby intravenózní, která bývá podávána jednou za 3-4 týdny. Výhodou častějšího podávání je pak stabilnější hladina sérového IgG stejně jako vyšší předinfúzní hladiny IgG v séru. Neopominutelný je i fakt, že subkutánní imunoglobulinová léčba nebývá doprovázena vedlejšími reakcemi, na rozdíl od léčby intravenózní.

Subkutánní imunoglobulinová léčba je hrazena i u nemocných s hematologickými malignitami (CLL, myelom, lymfomy). K naplnění této indikace je samozřejmě nutné pacienta vybavit i injekčními jehlami, které jsou pro subkutánní podávání určeny, stejně jak je tomu v oboru alergologie a klinické imunologie. Proto výbor České společnosti alergologie a klinické imunologie jednoznačně podporuje výše uvedený požadavek na rozšíření úhrady uvedených jehel i pro obor onkologie a hematologie.

S pozdravem

Prof. MUDr. Petr Panzner, CSc.  
Předseda ČSAKI ČLS JEP