

Číslo výkonu:

38250

Autorská odbornost:

(308) návykové nemoci

Popis:

(Pokud má výkon jednoznačné indikace, uveďte je.)

Výkon je určen pro pacienty s diagnózou F10 a F19.

Poznámka:

Čím výkon začíná:

Úvodním kontaktem s pacientem.

Obsah a rozsah výkonu:

Podání disulfiramu a zápis podání léku do tzv. Antabusové knížky.

Čím výkon končí:

Administrativní činnost v potřebném rozsahu, včetně záznamu do dokumentace.

Kategorie: P - hrazen plně;

Omezení místem: BOM - bez omezení

Omezení frekvencí: 1/1 den

Obvyklá doba trvání celého výkonu v minutách: 10

Podmínky:

(Pokud je omezení místem "S",

popište, čím je pracoviště specializované.)

Důvod změnového řízení:

(V případě, že výkon nahrazuje staré metody,

doplňte čísla původních výkonů.)

Neexistence výkonu.

Posouzení medicínské efektivity: Disulfiram (Antabus) je již od 50. let minulého století s úspěchem používán při léčbě závislosti na alkoholu. Jeho mechanismus účinku je v primárně psychologický a je založen na vysoce nepříjemném farmakologickém účinku, pokud je s disulfiramem konzumován alkohol (disulfiram-ethanolová reakce). Disulfiram blokuje enzym aldehyddehydrogenázu (ALDH), což vede k hromadění acetaldehydu, který je zodpovědný za nežádoucí účinky – tachykardii, návaly, nevolnost, zvracení. Psychologická hrozba disulfiram-ethanolové reakce posiluje odmítání alkoholu a je zodpovědná za účinnost léčby (Azrin a kol., 1982; Skinner a kol., 2010). Jedná se tedy o tzv. senzitivizující látku (zhoršuje toleranci k alkoholu). Disulfiram je podáván obvykle v dávce mezi 250 a 500 mg/den 2x týdně 400-800mg - tedy 2x týdně 1-2 tbl. Aplikace disulfiramu se neobejde bez důkladné edukace, protože pokud má být disulfiram používán, musí pacient během užívání léku jasně rozumět rizikům v případě konzumace alkoholu, neboť se může projevit srdeční, jaterní a neurologická toxicita acetaldehydu. Pacient podepisuje před začátkem léčby disulfiramem informovaný souhlas, který je součástí zdravotnické dokumentace. Lékař a pacient se musí dohodnout na potřebě dalšího klinického dohledu a sledování účinnosti a vedlejších účinků. Je rovněž zřejmé, že léčba disulfiramem představuje pouze doplňkovou terapií a že primární je podpora, dohled, psychoterapie a další terapeutické intervence. Disulfiram je užíván spolupracujícími pacienty bez dohledu, častěji je aplikována terapie pod dohledem (tzv. supervidované podávání, kterému předchází orientační dechová zkouška na přítomnost alkoholu). Je účinný především v krátkodobém horizontu (6 měsíců), dlouhodobý účinek léčby disulfiramem, pokud není doprovázena dalšími intervencemi, je sporný (Wright a Moore, 1990).

Ekonomický dopad:
(Doplňte odhadovaný počet pacientů za rok)
2500 pacientů za rok.

Porovnání s prokázaným léčebným přínosem: Neexistují podobné postupy.

Způsob úhrady v dalších zemích: Není známo.

Další odbornosti:

Kód	Název	Režie

Nositelé:

Pořadí	Kategorie	Funkce	Praxe	Čas	Poznámka	Aktuální body
10	L3	lékař s atestací nebo certifikovaným kurzem v oboru návykové nemoci, psychiatr, praktický lékař			10	107,16
Celkem:						107,16

Přímo spotřebovaný materiál - PMAT:

Kód	Název	Doplňek	Množství	Jednotka	Cena	Body
Celkem:						0,00 0,00

Přímo spotřebované léčivé přípravky - PLP:

Kód	Název	Doplňek ATC	Omezení	Množství	Jednotka	Cena	Body
Celkem:							0,00 0,00

Přístroje:

Kód	Název	D.Ž.	N.Ú.	D.P.	Procento z výkonu	Cena	Body
Celkem:							0,00 0,00

ZUM:

Kód	Název
Položky mimo číselník	
Název	Popis

ZULP:

Kód	Název
-----	-------

Položky mimo číselník

Název Popis

Bodová hodnota	Přímé 0,00	Osobní 107,16	Režijní 35,10	Celkem 142
---------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------