

POUŽITÍ DOAC STOP TABLETY PŘI ELIMINACI VLIVU ANTIKOAGULAČNÍ LÉČBY

Číslo výkonu:

96103

Autorská odbornost:

(818) laboratoř hematologická

Popis:

(Pokud má výkon jednoznačné indikace, uveďte je.)

Přímé inhibitory koagulace (DOAC) dabigatran (Pradaxa), rivaroxaban (Xarelto), apixaban (Eliquis) a edoxaban (Lixiana) ovlivňují většinu koagulačních testů, které mohou zkreslit závěrečné hodnocení stavu pacienta. Použitím DOAC stop tablet můžeme odlišit skutečné onemocnění od falešné positivity způsobné vlivem léků v době, kdy vysazení léčby není možné. Jedná se o rychlou in vitro metodu, při které získáme plazmu bez přímého inhibitoru koagulace, kterou pak dále využíváme pro koagulační stanovení.

Poznámka:

Čím výkon začíná:

Registrace vzorku plazmy v laboratoři. Posouzení VŠ nelékařem jakou dávku tablet použít dle hladiny léku.

Obsah a rozsah výkonu:

Čerstvý nativní vzorek – 1 ml citrátové plazmy napipetujeme do mikrozkušavky a přidáme 1 tabletu DOAC Stop. Mírně promícháme a necháme působit 5 minut. Centrifugujeme 5 minut při 2500 g. Čistou plazmu přepipetujeme do jiné mikrozkušavky. Přímě měříme požadovaná vyšetření nebo zamrazíme aliquot pro další vyšetření.

Čím výkon končí:

Předáním aliquotu plazmy bez vlivu léku pro další vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně;

Omezení místem: S - pouze na specializovaném pracovišti

Omezení frekvencí: 8/1 den

Obvyklá doba trvání celého výkonu v minutách: 10

Podmínky:

(Pokud je omezení místem "S",

popište, čím je pracoviště specializované.)

Specializovaným hematologickým pracovištěm se rozumí pracoviště s odpovídajícím technickým vybavením, na kterém je zajištěna denní přítomnost lékaře i nelékaře s odbornostmi 818, 202 a 222 a s úvazky 0,5 a/nebo vyššími.

Důvod změnového řízení:

(V případě, že výkon nahrazuje staré metody,

doplňte čísla původních výkonů.)

Antikoagulační léčba zasahuje hemostatický systém různým způsobem závislým na druhu použitého antikoagulantia. Přímé inhibitory koagulace (DOAC) dabigatran (Pradaxa), rivaroxaban (Xarelto), apixaban (Eliquis) a edoxaban (Lixiana) patří k antikoagulační léčbě, která se nově používá v posledních přibližně deseti letech. Při vyšetřování pacientů užívajících DOAC může dojít k významnému ovlivnění většiny koagulačních testů, které mohou zkreslit závěrečné hodnocení stavu pacienta. Pokud chceme hodnotit stav pacienta, je nutné mít skutečný obraz hemostázy bez ovlivnění léky. Použitím DOAC stop tablet můžeme odlišit skutečné onemocnění od falešné positivity způsobné vlivem léků v době, kdy vysazení léčby není možné. Jedná se o rychlou in vitro metodu, při které získáme plazmu bez přímého inhibitoru koagulace, kterou pak dále využíváme pro koagulační stanovení. Tento výkon v seznamu zdravotních výkonů chybí.

Kód	Název	Doplněk	Množství	Jednotka	Cena	Body
					Celkem:	6,30 6,30

A084822	Koagulace - paušál spotřebního materiálu	1	6,30	6,30
Celkem:			6,30	6,30

Přímo spotřebované léčivé přípravky - PLP:

Kód	Název	Doplňek ATC	Omezení	Množství	Jednotka	Cena	Body
A008245	DOAC stop tableta (Haematex) Product			0,2		774,00	154,80
Celkem:						774,00	154,80

Přístroje:

Kód	Název	D.Ž.	N.Ú.	D.P.	Procento z výkonu	Cena	Body
M1634	Pipeta dávkovací v ceně 12 798,-	4	0	4	100,00 %	12 798,00	0,56
A001464	Centrifuga laboratorní	6	12500	4	100,00 %	250 000,00	11,38
Celkem:						262 798,00	11,93

ZUM:

Kód	Název
-----	-------

Položky mimo číselník

Název	Popis
-------	-------

ZULP:

Kód	Název
-----	-------

Položky mimo číselník

Název	Popis
-------	-------

Bodová hodnota	Přímé	Osobní	Režijní	Celkem
	173,03	46,57	40,40	260