

Číslo výkonu:

**304-2019-12-18-12-09-39**

Autorská odbornost:

**(304) neonatologie**

**Popis:**

*(Pokud má výkon jednoznačné indikace, uveďte je.)*

Edukace kvalifikovaným odborníkem o významu a technice kojení na základě indikace ošetřujícího lékaře (neonatologa při propuštění, registrujícího PLDD po propuštění z porodnice) při zjištěném riziku poruchy laktace. Nácvik potřebných dovedností.

**Čím výkon začíná:**

Seznámení se se zdravotnickou dokumentací. Zhodnocení stavu prsů a správné techniky sání, zhodnocení správné techniky kojení.

**Obsah a rozsah výkonu:**

Edukace pacienta o důvodech, smyslu a přínosu kojení. Seznámení s technikami kojení. Poučení o způsobech podpory laktace, tvorby mateřského mléka, odstříkávání, alternativního způsobu dokrmování. Detekce překážek a problémů v kojení ze strany matky a dítěte. Nácvik vhodné techniky kojení. Současně je hlídán prospívání novorozence.

**Čím výkon končí:**

Ověřením porozumění edukovaným. Zápisem do zdravotnické dokumentace v době hospitalizace, v případě poskytnutí výkonu v domácím prostředí vypracováním zprávy pro indikujícího ošetřujícího lékaře. Stanovením frekvence a způsobu sledování odborným pracovníkem.

**Kategorie:** P - hrazen plně;

**Omezení místem:** A - pouze ambulantně

**Omezení frekvencí:** 2x v prvních 4 týdnech po porodu živě narozeného dítěte

**Obvyklá doba trvání celého výkonu v minutách:** 45

**Podmínky:**

*(Pokud je omezení místem "S", popište, čím je pracoviště specializované.)*

**Důvod změnového řízení:**

*(V případě, že výkon nahrazuje staré metody, doplňte čísla původních výkonů.)*

Zabezpečení a dostupnost včasné, pokračující a trvalé podpory kvalifikovaným laktačním poradcem je klíčovým faktorem pro úspěch kojení.

**Posouzení medicínské efektivity:** Kojení je přínosné pro zdraví matek a dětí a podporuje veřejné zdraví. Kojení snižuje výskyt akutních infekcí (průjmy, pneumonie, KHCD,) a hlavně nepřenosných chorob (obezita, diabetes mellitus, karcinom prsu). Přestože 95,1% žen začíná kojit (ÚZIS 2017, 114,4 tisíc živě narozených dětí), do 6 týdne ukončí kojení 17% žen, ve 3 měsících dalších 17,5% žen, do 6 měsíce 22,3%, takže do 6 měsíce přestává kojit 56,8% žen a výlučně 66%. Podporované matky mají 2,5x větší pravděpodobnosti, že budou kojit. Podpora kojení je

| Kód     | Název | Doplňek ATC | Omezení | Množství | Jednotka | Cena | Body |
|---------|-------|-------------|---------|----------|----------|------|------|
| Celkem: |       |             |         |          |          | 0,00 | 0,00 |

**Přístroje:**

| Kód | Název | D.Ž. | N.Ú. | D.P. | Procento z výkonu | Cena           | Body             |
|-----|-------|------|------|------|-------------------|----------------|------------------|
|     |       |      |      |      |                   | <b>Celkem:</b> | <b>0,00 0,00</b> |

**ZUM:**

| Kód | Název |
|-----|-------|
|-----|-------|

Položky mimo číselník

| Název | Popis |
|-------|-------|
|-------|-------|

**ZULP:**

| Kód | Název |
|-----|-------|
|-----|-------|

Položky mimo číselník

| Název | Popis |
|-------|-------|
|-------|-------|

|             |              |                |               |
|-------------|--------------|----------------|---------------|
| <b>Body</b> | <b>Přímé</b> | <b>Režijní</b> | <b>Celkem</b> |
| <b>118</b>  |              | <b>144</b>     | <b>261</b>    |